
V Atlas de Incidencia del Cáncer en el Uruguay

2012-2016

Enrique Barrios / Mariela Garau
Rafael Alonso / Carina Musetti



Comisión
contra
el Cáncer

Registro Nacional
del Cáncer

V Atlas de Incidencia del Cáncer en el Uruguay

2012-2016

Enrique Barrios / Mariela Garau
Rafael Alonso / Carina Musetti

Programa Vigilancia Epidemiológica - Registro Nacional de Cáncer
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER
Brandzen 1961 piso 12 ap. 1201
Montevideo, URUGUAY
Tel. (598) 2402 0807 (*) (int. 111)
Fax (598) 2402 0810
Mail: rnc@urucan.org.uy
www.comisioncancer.org.uy

Barrios, Enrique

**V Atlas de Incidencia del cáncer en el Uruguay
/ Enrique Barrios, Mariela Garau, Rafael Alonso, Carina
Musetti.**

**Montevideo: Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer,
2020.**

124p.: ilustr.

ISBN 978-9974-8609-1-9

**NEOPLASMAS-ATLAS /NEOPLASMAS -
EPIDEMIOLOGIA/URUGUAY. I. Título. II. Garau, M., coaut.
III. Alonso, R., coaut. IV. Musetti, C., coaut. V. Comisión
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer.**

**National Library of Medicine Classification:
WA900.DU7**

COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

Presidente

Dr. Robinson Rodríguez
Delegado del Poder Ejecutivo

Vicepresidente

Prof. Dra. Lucía Delgado
Delegada de la Facultad de Medicina

Secretario

Dr. Marcos Torres Amorín
Delegado de la Federación Médica del Interior

Tesorerera

Dra. Ana Rodríguez Martinol
Delegada de la Administración Nacional de Educación Pública

Vocal

Dr. Bernardo Aizen
Delegado del Sindicato Médico del Uruguay

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO NACIONAL DE CANCER

BUSCADORES DE DATOS

Coordinador

Prof. Dr. Enrique Barrios

Asistentes Técnicos

Ing. Rafael Alonso (*)
Dra. Mariela Garau
Dra. Carina Musetti

Secretarias

Silvia Robaina
Andrea Mederos
Marcela Vázquez

(*) Profesor del Depto. de
Métodos Cuantitativos
Facultad de Medicina

DEPTO. DE INFORMATICA

Coordinador

A/S Nicolás Vacca

Asistente Técnico

A/G Bruno Camargo

Montevideo

Gerardo Bédouchaud
Matilde Boada
Silvana Cabrera
Mercedes Dell
Mauricio Ferratti
Esteban Louise
Natalia De León
Paula Petruskevicius
Ana Laura Suárez
Marcela Vázquez

Artigas

Emilio García

Canelones

Carolina Polnitsky
Silvana Cabrera

Cerro Largo

Andrea Martínez

Colonia

Rosana Cayrus
Jorge Sosa Días

Durazno

María Ramírez

Flores

Tania Danovich

Florida

María Lorena Pérez

Lavalleja

María Noel Leiva

Maldonado

Carina Agriel

Paysandú

Silvina Heinzen

Río Negro

Carola López

Rivera

Rodrigo Bizera

Rocha

Miría Pereyra

Salto

Viviana Domínguez

San José

Carina Musetti

Soriano

Carola López

Tacuarembó

Mariana Telesca

Treinta y Tres


María Noel Leiva

AGRADECIMIENTO

También agradecemos la valiosa tarea que desempeñaron las siguientes personas que fueron parte del Registro Nacional de Cáncer en el periodo referido en esta publicación: María Elena Bonnefon, Mariana Robaina, Patricio Torres, Graciela Borba, Susana Dufour, Giovana Real, Frances Bergeret, Ana Bonti, Marcela Castro, Simón Leibovici, Juan Louise, Manuel Martínez, Guillermina Nieves, Carolina Pintos, Deborah Santos, Ana Vera, Isabel Ressio, Yoselin Dungey, Mariana Perera, Giovana Suárez.

URUGUAY


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el período | Tasa Esp. | Nº casos en el período | Tasa Esp. |
| 0-4 | 103 | 19.09 | 90 | 17.49 |
| 5-9 | 77 | 13.38 | 47 | 8.57 |
| 10-14 | 70 | 10.82 | 64 | 10.33 |
| 15-19 | 106 | 15.84 | 120 | 18.54 |
| 20-24 | 218 | 36.56 | 203 | 33.50 |
| 25-29 | 326 | 59.30 | 414 | 73.44 |
| 30-34 | 410 | 70.35 | 647 | 104.80 |
| 35-39 | 624 | 110.32 | 1184 | 200.23 |
| 40-44 | 869 | 179.98 | 1781 | 346.62 |
| 45-49 | 1280 | 264.04 | 2345 | 447.36 |
| 50-54 | 2417 | 498.49 | 2930 | 555.26 |
| 55-59 | 3921 | 906.70 | 3650 | 756.68 |
| 60-64 | 5243 | 1,462.53 | 3970 | 955.81 |
| 65-69 | 6380 | 2,101.69 | 4421 | 1,182.29 |
| 70-74 | 6818 | 2,916.39 | 4781 | 1,518.55 |
| 75-79 | 5883 | 3,128.37 | 4649 | 1,588.35 |
| 80-84 | 4629 | 3,497.07 | 4562 | 1,861.62 |
| 85 y más | 3599 | 4,196.99 | 4652 | 2,169.04 |
| Sin edad | 27 | 27.00 | 16 | 16.00 |
| Total | 43000 | | 40526 | |
| Tasa Aj. | | 362.00 | | 278.19 |
| Tasa Bruta | | 543.44 | | 470.52 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 7,149 | 16.63 |
| 2 | PULMON | 5,402 | 12.56 |
| 3 | COLO-RECTO | 4,688 | 10.90 |
| 4 | VEJIGA | 2,220 | 5.16 |
| 5 | RIÑON | 1,955 | 4.55 |
| | PRIMARIO DESC. | 1,130 | 2.63 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 9,630 | 23.76 |
| 2 | COLO-RECTO | 4,762 | 11.75 |
| 3 | PULMON | 1,928 | 4.76 |
| 4 | CUELLO DE UTERO | 1,570 | 3.87 |
| 5 | PANCREAS | 1,516 | 3.74 |
| | PRIMARIO DESC. | 1,120 | 2.76 |



MONTEVIDEO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 35 | 16.91 | 32 | 16.49 |
| 5-9 | 35 | 17.15 | 16 | 8.22 |
| 10-14 | 24 | 11.39 | 29 | 14.15 |
| 15-19 | 53 | 22.67 | 48 | 20.90 |
| 20-24 | 102 | 39.09 | 94 | 33.51 |
| 25-29 | 172 | 73.21 | 189 | 76.25 |
| 30-34 | 211 | 86.23 | 317 | 122.49 |
| 35-39 | 318 | 140.67 | 555 | 229.68 |
| 40-44 | 423 | 232.65 | 876 | 441.24 |
| 45-49 | 614 | 333.27 | 1117 | 538.72 |
| 50-54 | 1115 | 575.30 | 1492 | 660.05 |
| 55-59 | 1875 | 1,085.16 | 1841 | 889.35 |
| 60-64 | 2354 | 1,745.94 | 1946 | 1,138.66 |
| 65-69 | 2794 | 2,446.80 | 2172 | 1,348.37 |
| 70-74 | 2961 | 3,433.20 | 2399 | 1,786.62 |
| 75-79 | 2614 | 3,508.68 | 2310 | 1,726.46 |
| 80-84 | 2198 | 3,845.28 | 2344 | 1,947.01 |
| 85 y más | 1670 | 4,479.49 | 2492 | 2,315.94 |
| Sin edad | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 |
| Total | 19572 | | 20274 | |
| Tasa Aj. | | 424.15 | | 323.55 |
| Tasa Bruta | | 639.80 | | 576.09 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 2,986 | 15.26 |
| 2 PULMON | 2,246 | 11.48 |
| 3 COLO-RECTO | 2,089 | 10.67 |
| 4 VEJIGA | 1,059 | 5.41 |
| 5 RIÑON | 904 | 4.62 |
| PRIMARIO DESC. | 427 | 2.18 |




| Mujeres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 4,913 | 24.23 |
| 2 COLO-RECTO | 2,234 | 11.02 |
| 3 PULMON | 987 | 4.87 |
| 4 PANCREAS | 722 | 3.56 |
| 5 TIROIDES | 722 | 3.56 |
| PRIMARIO DESC. | 504 | 2.49 |



INTERIOR


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el período | Tasa Esp. | Nº casos en el período | Tasa Esp. |
| 0-4 | 68 | 20.45 | 58 | 18.10 |
| 5-9 | 42 | 11.31 | 31 | 8.76 |
| 10-14 | 46 | 10.55 | 35 | 8.44 |
| 15-19 | 53 | 12.17 | 72 | 17.24 |
| 20-24 | 116 | 34.60 | 109 | 33.49 |
| 25-29 | 154 | 48.91 | 225 | 71.24 |
| 30-34 | 199 | 58.86 | 330 | 92.03 |
| 35-39 | 306 | 90.11 | 629 | 179.87 |
| 40-44 | 446 | 148.17 | 905 | 287.04 |
| 45-49 | 666 | 221.60 | 1228 | 387.57 |
| 50-54 | 1302 | 447.35 | 1438 | 476.73 |
| 55-59 | 2046 | 787.95 | 1809 | 656.95 |
| 60-64 | 2889 | 1,291.69 | 2024 | 827.97 |
| 65-69 | 3586 | 1,893.59 | 2249 | 1,056.61 |
| 70-74 | 3857 | 2,614.28 | 2382 | 1,319.20 |
| 75-79 | 3269 | 2,878.86 | 2339 | 1,472.06 |
| 80-84 | 2431 | 3,232.41 | 2218 | 1,779.15 |
| 85 y más | 1929 | 3,979.70 | 2160 | 2,021.13 |
| Sin edad | 23 | 23.00 | 11 | 11.00 |
| Total | 23428 | | 20252 | |
| Tasa Aj. | | 322.93 | | 245.57 |
| Tasa Bruta | | 482.71 | | 397.58 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 4,163 | 17.77 |
| 2 PULMON | 3,156 | 13.47 |
| 3 COLO-RECTO | 2,599 | 11.09 |
| 4 VEJIGA | 1,161 | 4.96 |
| 5 RIÑON | 1,051 | 4.49 |
| PRIMARIO DESC. | 703 | 3.00 |




| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 4,717 | 23.29 |
| 2 COLO-RECTO | 2,528 | 12.48 |
| 3 CUELLO DE UTERO | 964 | 4.76 |
| 4 PULMON | 941 | 4.65 |
| 5 PANCREAS | 794 | 3.92 |
| PRIMARIO DESC. | 616 | 3.04 |



DISTRIBUCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL CANCER EN CADA DEPARTAMENTO

ARTIGAS


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 5 | 38.93 | 3 | 25.94 |
| 5-9 | 2 | 14.52 | 1 | 8.18 |
| 10-14 | 2 | 11.01 | 1 | 5.57 |
| 15-19 | 2 | 11.66 | 2 | 11.47 |
| 20-24 | 7 | 64.60 | 3 | 27.00 |
| 25-29 | 3 | 25.48 | 9 | 76.80 |
| 30-34 | 5 | 51.27 | 15 | 129.35 |
| 35-39 | 5 | 53.45 | 24 | 222.30 |
| 40-44 | 11 | 112.54 | 30 | 256.08 |
| 45-49 | 20 | 168.71 | 36 | 285.19 |
| 50-54 | 45 | 410.13 | 40 | 356.35 |
| 55-59 | 62 | 614.17 | 54 | 534.81 |
| 60-64 | 88 | 1,056.55 | 54 | 641.41 |
| 65-69 | 97 | 1,501.55 | 37 | 508.87 |
| 70-74 | 106 | 2,015.98 | 62 | 1,144.76 |
| 75-79 | 92 | 2,517.79 | 68 | 1,343.61 |
| 80-84 | 78 | 3,105.10 | 63 | 1,678.21 |
| 85 y más | 51 | 3,661.16 | 44 | 1,466.18 |
| Sin edad | 0 | | 0 | |
| Total | 681 | | 546 | |
| Tasa Aj. | | 270.24 | | 199.53 |
| Tasa Bruta | | 391.49 | | 298.38 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|--------------------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 134 | 19.68 |
| 2 PULMON | 98 | 14.39 |
| 3 COLO-RECTO | 74 | 10.87 |
| 4 ESTOMAGO | 42 | 6.17 |
| 5 CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 32 | 4.70 |
| PRIMARIO DESC. | 27 | 3.96 |



| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 129 | 23.63 |
| 2 COLO-RECTO | 77 | 14.10 |
| 3 CUELLO DE UTERO | 44 | 8.06 |
| 4 PULMON | 28 | 5.13 |
| 5 TIROIDES | 25 | 4.58 |
| PRIMARIO DESC. | 17 | 3.11 |



ARTIGAS

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE ARTIGAS | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 75 | 18.70 |
| PULMON | 49 | 12.22 |
| COLO-RECTO | 47 | 11.72 |
| PIEL NO MELANOMA | 31 | 7.73 |
| ESTOMAGO | 27 | 6.73 |
| PANCREAS | 20 | 4.99 |
| ESOFAGO | 18 | 4.49 |
| RIÑON | 17 | 4.24 |
| OTROS | 117 | 29.18 |
| TOTAL | 401 | |

| BELLA UNION | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 42 | 24.85 |
| PULMON | 32 | 18.93 |
| COLO-RECTO | 15 | 8.88 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 8 | 4.73 |
| ESOFAGO | 8 | 4.73 |
| PANCREAS | 7 | 4.14 |
| PRIMARIO DESC. | 7 | 4.14 |
| OTROS | 50 | 29.59 |
| TOTAL | 169 | |

| BERNABE RIVERA | | |
|----------------|-------|--|
| | Casos | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| PANCREAS | 1 | |
| LARINGE | 1 | |

| SEQUEIRA | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| PROSTATA | 2 | |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |

| TOMAS GOMENSORO | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 4 | 16.67 |
| PRIMARIO DESC. | 4 | 16.67 |
| PROSTATA | 3 | 12.50 |
| ESTOMAGO | 2 | 8.33 |
| RIÑON | 2 | 8.33 |
| VEJIGA | 2 | 8.33 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 2 | 8.33 |
| OTROS | 5 | 20.83 |
| TOTAL | 24 | |

| BALTASAR BRUM | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 5 | 21.74 |
| PROSTATA | 4 | 17.39 |
| ESOFAGO | 3 | 13.04 |
| ESTOMAGO | 2 | 8.70 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 2 | 8.70 |
| OTROS | 7 | 30.43 |
| TOTAL | 23 | |

| LAS PIEDRAS | | |
|------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 2 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| PROSTATA | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| RIÑON | 1 | |

MUJERES

| CIUDAD DE ARTIGAS | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 85 | 24.50 |
| COLO-RECTO | 53 | 15.27 |
| CUELLO DE UTERO | 29 | 8.36 |
| PULMON | 15 | 4.32 |
| RIÑON | 15 | 4.32 |
| PIEL NO MELANOMA | 15 | 4.32 |
| PRIMARIO DESC. | 14 | 4.03 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 14 | 4.03 |
| OTROS | 107 | 30.84 |
| TOTAL | 347 | |

| BALTASAR BRUM | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| MAMA | 3 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |
| PANCREAS | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| OJO | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| TOTAL | 10 | |

| BELLA UNION | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 28 | 22.05 |
| COLO-RECTO | 16 | 12.60 |
| PULMON | 10 | 7.87 |
| CUELLO DE UTERO | 9 | 7.09 |
| TIROIDES | 9 | 7.09 |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 6.30 |
| OTROS | 47 | 37.01 |
| TOTAL | 127 | |

| SEQUEIRA | | |
|--------------------|-------|--|
| | Casos | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | |

| TOMAS GOMENSORO | | |
|-----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 6 | 33.33 |
| COLO-RECTO | 2 | 11.11 |
| TIROIDES | 2 | 11.11 |
| OTROS | 8 | 44.44 |
| TOTAL | 18 | |

| PINTADITO | | |
|-----------|-------|--|
| | Casos | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| RIÑON | 1 | |

| CAINSA | | |
|------------------|-------|--|
| | Casos | |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | |
| MAMA | 1 | |
| CUELLO DE UTERO | 1 | |
| CUERPO DE UTERO | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |

| LAS PIEDRAS | | |
|----------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| CUELLO DE UTERO | 2 | |
| SARCOMAS DE PARTES BLANDAS | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |

CANELONES


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 14 | 15.77 | 17 | 19.60 |
| 5-9 | 10 | 10.03 | 9 | 9.42 |
| 10-14 | 10 | 9.16 | 6 | 5.69 |
| 15-19 | 14 | 12.33 | 15 | 14.21 |
| 20-24 | 23 | 23.96 | 31 | 32.56 |
| 25-29 | 35 | 42.16 | 57 | 66.06 |
| 30-34 | 43 | 46.05 | 79 | 81.44 |
| 35-39 | 81 | 84.67 | 153 | 149.77 |
| 40-44 | 134 | 159.08 | 220 | 252.55 |
| 45-49 | 194 | 237.98 | 299 | 341.52 |
| 50-54 | 307 | 379.12 | 352 | 423.85 |
| 55-59 | 512 | 723.31 | 498 | 660.04 |
| 60-64 | 709 | 1,240.14 | 474 | 743.80 |
| 65-69 | 918 | 1,955.65 | 590 | 1,037.11 |
| 70-74 | 938 | 2,535.07 | 601 | 1,278.94 |
| 75-79 | 756 | 2,609.42 | 604 | 1,466.73 |
| 80-84 | 568 | 2,992.94 | 531 | 1,544.41 |
| 85 y más | 458 | 3,767.69 | 547 | 1,988.30 |
| Sin edad | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 |
| Total | 5726 | | 5086 | |
| Tasa Aj. | | 308.55 | | 228.86 |
| Tasa Bruta | | 441.16 | | 369.15 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 907 | 15.84 |
| 2 PULMON | 796 | 13.90 |
| 3 COLO-RECTO | 671 | 11.72 |
| 4 VEJIGA | 319 | 5.57 |
| 5 RIÑON | 269 | 4.70 |
| PRIMARIO DESC. | 183 | 3.20 |



| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 1,244 | 24.46 |
| 2 COLO-RECTO | 619 | 12.17 |
| 3 PULMON | 250 | 4.92 |
| 4 CUELLO DE UTERO | 204 | 4.01 |
| 5 PANCREAS | 200 | 3.93 |
| PRIMARIO DESC. | 143 | 2.81 |



CANELONES

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE CANELONES | | |
|---------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 69 | 16.31 |
| PIEL NO MELANOMA | 63 | 14.89 |
| COLO-RECTO | 55 | 13.00 |
| PULMON | 45 | 10.64 |
| VEJIGA | 26 | 6.15 |
| ESTOMAGO | 20 | 4.73 |
| RIÑON | 17 | 4.02 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 14 | 3.31 |
| OTROS | 114 | 26.95 |
| TOTAL | 423 | |

| SANTA LUCIA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 31 | 15.90 |
| COLO-RECTO | 27 | 13.85 |
| PROSTATA | 23 | 11.79 |
| PULMON | 22 | 11.28 |
| VEJIGA | 10 | 5.13 |
| PRIMARIO DESC. | 10 | 5.13 |
| ESOFAGO | 8 | 4.10 |
| RIÑON | 8 | 4.10 |
| OTROS | 56 | 28.72 |
| TOTAL | 195 | |

| JOAQUIN SUAREZ | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 11 | 18.03 |
| COLO-RECTO | 9 | 14.75 |
| PROSTATA | 7 | 11.48 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 6 | 9.84 |
| PIEL NO MELANOMA | 6 | 9.84 |
| VEJIGA | 4 | 6.56 |
| TESTICULO | 3 | 4.92 |
| OTROS | 15 | 24.59 |
| TOTAL | 61 | |

| SAN RAMON | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 24 | 25.81 |
| PIEL NO MELANOMA | 13 | 13.98 |
| COLO-RECTO | 12 | 12.90 |
| PULMON | 11 | 11.83 |
| VEJIGA | 6 | 6.45 |
| OTROS | 27 | 29.03 |
| TOTAL | 93 | |

| LAS PIEDRAS | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 132 | 16.77 |
| PIEL NO MELANOMA | 114 | 14.49 |
| PULMON | 87 | 11.05 |
| COLO-RECTO | 83 | 10.55 |
| VEJIGA | 39 | 4.96 |
| ESTOMAGO | 38 | 4.83 |
| RIÑON | 38 | 4.83 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 31 | 3.94 |
| OTROS | 225 | 28.59 |
| TOTAL | 787 | |

| CIUDAD DE LA COSTA | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 170 | 15.98 |
| PROSTATA | 169 | 15.88 |
| PULMON | 129 | 12.12 |
| COLO-RECTO | 114 | 10.71 |
| VEJIGA | 59 | 5.55 |
| RIÑON | 53 | 4.98 |
| PANCREAS | 50 | 4.70 |
| ESTOMAGO | 38 | 3.57 |
| OTROS | 282 | 26.50 |
| TOTAL | 1064 | |

| PANDO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 68 | 20.12 |
| PROSTATA | 51 | 15.09 |
| COLO-RECTO | 46 | 13.61 |
| PIEL NO MELANOMA | 26 | 7.69 |
| ESTOMAGO | 15 | 4.44 |
| PANCREAS | 15 | 4.44 |
| RIÑON | 14 | 4.14 |
| PRIMARIO DESC. | 12 | 3.55 |
| OTROS | 91 | 26.92 |
| TOTAL | 338 | |

| SAUCE | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 27 | 20.00 |
| COLO-RECTO | 20 | 14.81 |
| PULMON | 14 | 10.37 |
| PIEL NO MELANOMA | 11 | 8.15 |
| VEJIGA | 9 | 6.67 |
| PRIMARIO DESC. | 7 | 5.19 |
| ESOFAGO | 5 | 3.70 |
| OTROS | 42 | 31.11 |
| TOTAL | 135 | |

| PARQUE DEL PLATA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 19 | 16.67 |
| PIEL NO MELANOMA | 17 | 14.91 |
| PULMON | 16 | 14.04 |
| COLO-RECTO | 14 | 12.28 |
| ESTOMAGO | 7 | 6.14 |
| RIÑON | 6 | 5.26 |
| VEJIGA | 6 | 5.26 |
| OTROS | 29 | 25.44 |
| TOTAL | 114 | |

| TALA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 27 | 20.77 |
| PROSTATA | 24 | 18.46 |
| COLO-RECTO | 11 | 8.46 |
| PULMON | 10 | 7.69 |
| VEJIGA | 9 | 6.92 |
| RIÑON | 7 | 5.38 |
| PRIMARIO DESC. | 6 | 4.62 |
| OTROS | 36 | 27.69 |
| TOTAL | 130 | |

| TOLEDO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 25 | 19.23 |
| PROSTATA | 14 | 10.77 |
| COLO-RECTO | 13 | 10.00 |
| PRIMARIO DESC. | 10 | 7.69 |
| ESTOMAGO | 9 | 6.92 |
| PIEL NO MELANOMA | 9 | 6.92 |
| OTROS | 50 | 38.46 |
| TOTAL | 130 | |

| PROGRESO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 22 | 17.46 |
| PULMON | 19 | 15.08 |
| COLO-RECTO | 15 | 11.90 |
| PROSTATA | 13 | 10.32 |
| VEJIGA | 8 | 6.35 |
| OTROS | 49 | 38.89 |
| TOTAL | 126 | |

| LA PAZ | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 28 | 15.14 |
| PROSTATA | 28 | 15.14 |
| PIEL NO MELANOMA | 23 | 12.43 |
| COLO-RECTO | 20 | 10.81 |
| VEJIGA | 13 | 7.03 |
| OTROS | 73 | 39.46 |
| TOTAL | 185 | |

| ATLANTIDA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 22 | 19.82 |
| PIEL NO MELANOMA | 21 | 18.92 |
| COLO-RECTO | 14 | 12.61 |
| PROSTATA | 12 | 10.81 |
| OTROS | 42 | 37.84 |
| TOTAL | 111 | |

| SANTA ROSA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 14 | 20.29 |
| PIEL NO MELANOMA | 12 | 17.39 |
| COLO-RECTO | 7 | 10.14 |
| PULMON | 7 | 10.14 |
| RIÑON | 6 | 8.70 |
| OTROS | 23 | 33.33 |
| TOTAL | 69 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 30 | 18.18 |
| PROSTATA | 27 | 16.36 |
| COLO-RECTO | 17 | 10.30 |
| PULMON | 15 | 9.09 |
| VEJIGA | 9 | 5.45 |
| ESTOMAGO | 8 | 4.85 |
| OTROS | 59 | 35.76 |
| TOTAL | 165 | |

MUJERES

| CIUDAD DE CANELONES | | |
|---------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 88 | 25.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 56 | 15.91 |
| COLO-RECTO | 52 | 14.77 |
| ESTOMAGO | 13 | 3.69 |
| PANCREAS | 12 | 3.41 |
| PRIMARIO DESC. | 11 | 3.13 |
| CUERPO DE UTERO | 10 | 2.84 |
| TIROIDES | 10 | 2.84 |
| OTROS | 100 | 28.41 |
| TOTAL | 352 | |

| ATLANTIDA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 21 | 21.88 |
| PIEL NO MELANOMA | 19 | 19.79 |
| COLO-RECTO | 14 | 14.58 |
| TIROIDES | 6 | 6.25 |
| PANCREAS | 4 | 4.17 |
| CUELLO DE UTERO | 4 | 4.17 |
| PRIMARIO DESC. | 4 | 4.17 |
| OTROS | 24 | 25.00 |
| TOTAL | 96 | |

| SAUCE | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 28 | 23.93 |
| COLO-RECTO | 17 | 14.53 |
| PIEL NO MELANOMA | 12 | 10.26 |
| ESTOMAGO | 6 | 5.13 |
| PULMON | 5 | 4.27 |
| CUERPO DE UTERO | 5 | 4.27 |
| TIROIDES | 5 | 4.27 |
| OTROS | 39 | 33.33 |
| TOTAL | 117 | |

| SAN RAMON | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 18 | 26.09 |
| COLO-RECTO | 11 | 15.94 |
| CUELLO DE UTERO | 5 | 7.25 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 7.25 |
| PANCREAS | 4 | 5.80 |
| OTROS | 26 | 37.68 |
| TOTAL | 69 | |

| LAS PIEDRAS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 161 | 22.39 |
| PIEL NO MELANOMA | 113 | 15.72 |
| COLO-RECTO | 91 | 12.66 |
| PULMON | 34 | 4.73 |
| PANCREAS | 29 | 4.03 |
| CUELLO DE UTERO | 26 | 3.62 |
| OVARIO | 26 | 3.62 |
| OTROS | 239 | 33.24 |
| TOTAL | 719 | |

| PROGRESO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 42 | 31.11 |
| COLO-RECTO | 17 | 12.59 |
| PIEL NO MELANOMA | 17 | 12.59 |
| OVARIO | 9 | 6.67 |
| CUELLO DE UTERO | 8 | 5.93 |
| PULMON | 7 | 5.19 |
| OTROS | 35 | 25.93 |
| TOTAL | 135 | |

| PARQUE DEL PLATA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 19 | 18.10 |
| PIEL NO MELANOMA | 15 | 14.29 |
| COLO-RECTO | 12 | 11.43 |
| PULMON | 7 | 6.67 |
| TIROIDES | 6 | 5.71 |
| OVARIO | 5 | 4.76 |
| PRIMARIO DESC. | 5 | 4.76 |
| OTROS | 36 | 34.29 |
| TOTAL | 105 | |

| CIUDAD DE LA COSTA | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 251 | 25.69 |
| PIEL NO MELANOMA | 140 | 14.33 |
| COLO-RECTO | 107 | 10.95 |
| PULMON | 67 | 6.86 |
| OVARIO | 41 | 4.20 |
| TIROIDES | 33 | 3.38 |
| CUERPO DE UTERO | 31 | 3.17 |
| CUELLO DE UTERO | 30 | 3.07 |
| OTROS | 277 | 28.35 |
| TOTAL | 977 | |

| PANDO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 81 | 26.05 |
| COLO-RECTO | 41 | 13.18 |
| PIEL NO MELANOMA | 24 | 7.72 |
| CUELLO DE UTERO | 20 | 6.43 |
| PANCREAS | 14 | 4.50 |
| OTROS | 131 | 42.12 |
| TOTAL | 311 | |

| SANTA LUCIA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 45 | 25.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 39 | 21.67 |
| COLO-RECTO | 27 | 15.00 |
| PULMON | 8 | 4.44 |
| CUERPO DE UTERO | 7 | 3.89 |
| TIROIDES | 7 | 3.89 |
| OTROS | 47 | 26.11 |
| TOTAL | 180 | |

| TOLEDO | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 33 | 21.15 |
| COLO-RECTO | 12 | 7.69 |
| CUELLO DE UTERO | 12 | 7.69 |
| PANCREAS | 10 | 6.41 |
| PULMON | 10 | 6.41 |
| PIEL NO MELANOMA | 10 | 6.41 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 9 | 5.77 |
| PRIMARIO DESC. | 7 | 4.49 |
| OTROS | 53 | 33.97 |
| TOTAL | 156 | |

| TALA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 23 | 19.33 |
| PIEL NO MELANOMA | 18 | 15.13 |
| COLO-RECTO | 17 | 14.29 |
| TIROIDES | 8 | 6.72 |
| PANCREAS | 6 | 5.04 |
| PRIMARIO DESC. | 6 | 5.04 |
| PULMON | 5 | 4.20 |
| CUERPO DE UTERO | 5 | 4.20 |
| OTROS | 31 | 26.05 |
| TOTAL | 119 | |

| LA PAZ | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 50 | 25.13 |
| COLO-RECTO | 30 | 15.08 |
| PIEL NO MELANOMA | 20 | 10.05 |
| PULMON | 13 | 6.53 |
| CUELLO DE UTERO | 9 | 4.52 |
| CUERPO DE UTERO | 9 | 4.52 |
| PRIMARIO DESC. | 9 | 4.52 |
| OTROS | 59 | 29.65 |
| TOTAL | 199 | |


| SANTA ROSA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 19 | 25.68 |
| PIEL NO MELANOMA | 15 | 20.27 |
| COLO-RECTO | 8 | 10.81 |
| PULMON | 6 | 8.11 |
| PRIMARIO DESC. | 4 | 5.41 |
| OVARIO | 3 | 4.05 |
| OTROS | 19 | 25.68 |
| TOTAL | 74 | |

| JOAQUIN SUAREZ | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 10 | 20.00 |
| COLO-RECTO | 6 | 12.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 10.00 |
| CUELLO DE UTERO | 4 | 8.00 |
| OTROS | 25 | 50.00 |
| TOTAL | 50 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 29 | 23.02 |
| MAMA | 28 | 22.22 |
| COLO-RECTO | 17 | 13.49 |
| VEJIGA | 7 | 5.56 |
| TIROIDES | 4 | 3.17 |
| OTROS | 41 | 32.54 |
| TOTAL | 126 | |

CERRO LARGO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 2 | 14.53 | 2 | 14.53 |
| 5-9 | 1 | 6.20 | 1 | 6.20 |
| 10-14 | 2 | 10.21 | 2 | 10.21 |
| 15-19 | 3 | 15.36 | 3 | 15.36 |
| 20-24 | 8 | 65.31 | 8 | 65.31 |
| 25-29 | 2 | 18.07 | 2 | 18.07 |
| 30-34 | 7 | 54.85 | 7 | 54.85 |
| 35-39 | 12 | 83.36 | 12 | 83.36 |
| 40-44 | 19 | 152.49 | 19 | 152.49 |
| 45-49 | 30 | 244.56 | 30 | 244.56 |
| 50-54 | 62 | 555.06 | 62 | 555.06 |
| 55-59 | 110 | 992.87 | 110 | 992.87 |
| 60-64 | 128 | 1,232.90 | 128 | 1,232.90 |
| 65-69 | 177 | 2,136.39 | 177 | 2,136.39 |
| 70-74 | 186 | 2,632.70 | 186 | 2,632.70 |
| 75-79 | 163 | 3,330.61 | 163 | 3,330.61 |
| 80-84 | 111 | 4,080.88 | 111 | 4,080.88 |
| 85 y más | 112 | 5,708.46 | 112 | 5,708.46 |
| Sin edad | 0 | - | 0 | - |
| Total | 1135 | | 1135 | |
| Tasa Aj. | | 359.23 | | 359.23 |
| Tasa Bruta | | 562.53 | | 562.53 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 217 | 19.12 |
| 2 PULMON | 174 | 15.33 |
| 3 COLO-RECTO | 120 | 10.57 |
| 4 VEJIGA | 49 | 4.32 |
| 5 ESTOMAGO | 47 | 4.14 |
| PRIMARIO DESC. | 21 | 1.85 |



| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 195 | 21.38 |
| 2 COLO-RECTO | 121 | 13.27 |
| 3 PULMON | 51 | 5.59 |
| 4 CUELLO DE UTERO | 51 | 5.59 |
| 5 PANCREAS | 39 | 4.28 |
| PRIMARIO DESC. | 35 | 3.84 |



CERRO LARGO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE MELO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 156 | 19.35 |
| PIEL NO MELANOMA | 147 | 18.24 |
| PULMON | 119 | 14.76 |
| COLO-RECTO | 92 | 11.41 |
| VEJIGA | 39 | 4.84 |
| ESTOMAGO | 33 | 4.09 |
| RIÑON | 33 | 4.09 |
| OTROS | 187 | 23.20 |
| TOTAL | 806 | |

| RIO BRANCO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 36 | 23.08 |
| PULMON | 24 | 15.38 |
| PROSTATA | 24 | 15.38 |
| COLO-RECTO | 15 | 9.62 |
| OTROS | 57 | 36.54 |
| TOTAL | 156 | |

| TUPAMBAE | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 3 | 23.08 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 23.08 |
| OTROS | 7 | 53.85 |
| TOTAL | 13 | |

| FRAILE MUERTO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 9 | 23.68 |
| PULMON | 6 | 15.79 |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 10.53 |
| ESOFAGO | 3 | 7.89 |
| PANCREAS | 3 | 7.89 |
| OTROS | 13 | 34.21 |
| TOTAL | 38 | |

| PLACIDO ROSAS | | |
|---------------|-------|---|
| | Casos | % |
| ESOFAGO | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| OJO | 1 | |
| MIELOMA | 1 | |

| ISIDORO NOBLIA | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 7 | 17.95 |
| PROSTATA | 7 | 17.95 |
| PIEL NO MELANOMA | 6 | 15.38 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 4 | 10.26 |
| COLO-RECTO | 4 | 10.26 |
| OTROS | 11 | 28.21 |
| TOTAL | 39 | |

| ACEGUA | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 4 | 40.00 |
| PROSTATA | 2 | 20.00 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | 10.00 |
| ESOFAGO | 1 | 10.00 |
| COLO-RECTO | 1 | 10.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | 10.00 |
| TOTAL | 10 | |

| AREVALO | | |
|-----------|-------|---|
| | Casos | % |
| ESOFAGO | 1 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| TESTICULO | 1 | |
| VEJIGA | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 7 | 26.92 |
| COLO-RECTO | 6 | 23.08 |
| PULMON | 6 | 23.08 |
| ESOFAGO | 3 | 11.54 |
| LEUCEMIA | 2 | 7.69 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | 3.85 |
| ESTOMAGO | 1 | 3.85 |
| TOTAL | 26 | |

MUJERES

| CIUDAD DE MELO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 143 | 21.38 |
| PIEL NO MELANOMA | 100 | 14.95 |
| COLO-RECTO | 92 | 13.75 |
| CUELLO DE UTERO | 38 | 5.68 |
| PULMON | 37 | 5.53 |
| PANCREAS | 27 | 4.04 |
| PRIMARIO DESC. | 23 | 3.44 |
| ESTOMAGO | 21 | 3.14 |
| OVARIO | 20 | 2.99 |
| OTROS | 168 | 25.11 |
| TOTAL | 669 | |

| ISIDORO NOBLIA | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 6 | 31.58 |
| ESTOMAGO | 2 | 10.53 |
| COLO-RECTO | 2 | 10.53 |
| PULMON | 2 | 10.53 |
| OTROS | 7 | 36.84 |
| TOTAL | 19 | |

| ACEGUA | | |
|------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 2 | |
| CUELLO DE UTERO | 2 | |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | |
| PULMON | 1 | |
| OVARIO | 1 | |
| MIELOMA | 1 | |
| TOTAL | 9 | |

| FRAILE MUERTO | | |
|-----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 6 | 20.69 |
| MAMA | 4 | 13.79 |
| ESOFAGO | 3 | 10.34 |
| CUELLO DE UTERO | 2 | 6.90 |
| RIÑON | 2 | 6.90 |
| PRIMARIO DESC. | 2 | 6.90 |
| OTROS | 10 | 34.48 |
| TOTAL | 29 | |

| RIO BRANCO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 30 | 22.56 |
| PIEL NO MELANOMA | 22 | 16.54 |
| COLO-RECTO | 13 | 9.77 |
| PANCREAS | 11 | 8.27 |
| PRIMARIO DESC. | 10 | 7.52 |
| ESTOMAGO | 9 | 6.77 |
| OTROS | 38 | 28.57 |
| TOTAL | 133 | |

| PLACIDO ROSAS | | |
|--------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 1 | |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 2 | 18.18 |
| PULMON | 2 | 18.18 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 18.18 |
| OTROS | 5 | 45.45 |
| TOTAL | 11 | |

COLONIA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 3 | 14.99 | 5 | 25.03 |
| 5-9 | 2 | 9.26 | 1 | 4.80 |
| 10-14 | 3 | 12.74 | 2 | 9.19 |
| 15-19 | 4 | 17.42 | 4 | 17.82 |
| 20-24 | 8 | 41.03 | 7 | 38.30 |
| 25-29 | 10 | 48.94 | 21 | 105.93 |
| 30-34 | 18 | 83.77 | 27 | 122.87 |
| 35-39 | 26 | 125.49 | 32 | 156.01 |
| 40-44 | 27 | 134.52 | 62 | 313.07 |
| 45-49 | 47 | 259.01 | 91 | 447.92 |
| 50-54 | 69 | 351.11 | 104 | 534.35 |
| 55-59 | 177 | 980.12 | 118 | 640.82 |
| 60-64 | 250 | 1,579.48 | 159 | 958.41 |
| 65-69 | 281 | 2,062.23 | 183 | 1,230.58 |
| 70-74 | 303 | 2,912.06 | 204 | 1,574.56 |
| 75-79 | 297 | 3,683.04 | 183 | 1,497.18 |
| 80-84 | 213 | 3,498.11 | 189 | 1,882.85 |
| 85 y más | 193 | 4,610.61 | 222 | 2,273.19 |
| Sin edad | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 |
| Total | 1934 | | 1615 | |
| Tasa Aj. | | 366.23 | | 274.69 |
| Tasa Bruta | | 635.39 | | 504.58 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 329 | 17.01 |
| 2 | COLO-RECTO | 235 | 12.15 |
| 3 | PULMON | 198 | 10.24 |
| 4 | RIÑON | 100 | 5.17 |
| 5 | VEJIGA | 92 | 4.76 |
| | PRIMARIO DESC. | 34 | 1.76 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 339 | 20.99 |
| 2 | COLO-RECTO | 217 | 13.44 |
| 3 | PANCREAS | 63 | 3.90 |
| 4 | PULMON | 58 | 3.59 |
| 5 | TIROIDES | 52 | 3.22 |
| | PRIMARIO DESC. | 35 | 2.17 |



COLONIA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| COLONIA DEL SACRAMENTO | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 100 | 24.27 |
| COLO-RECTO | 64 | 15.53 |
| PROSTATA | 50 | 12.14 |
| PULMON | 31 | 7.52 |
| VEJIGA | 23 | 5.58 |
| RIÑON | 21 | 5.10 |
| PANCREAS | 16 | 3.88 |
| ESTOMAGO | 15 | 3.64 |
| OTROS | 92 | 22.33 |
| TOTAL | 412 | |

| OMBUES DE LAVALLE | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 12 | 20.34 |
| PROSTATA | 12 | 20.34 |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 13.56 |
| COLO-RECTO | 7 | 11.86 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 3 | 5.08 |
| RIÑON | 3 | 5.08 |
| OTROS | 14 | 23.73 |
| TOTAL | 59 | |

| FLORENCIO SANCHEZ | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 11 | 39.29 |
| COLO-RECTO | 3 | 10.71 |
| PULMON | 3 | 10.71 |
| VEJIGA | 3 | 10.71 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 10.71 |
| OTROS | 5 | 17.86 |
| TOTAL | 28 | |

| CARMELO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 86 | 23.69 |
| PROSTATA | 54 | 14.88 |
| COLO-RECTO | 43 | 11.85 |
| PULMON | 36 | 9.92 |
| RIÑON | 20 | 5.51 |
| OTROS | 124 | 34.16 |
| TOTAL | 363 | |

| NUEVA PALMIRA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 27 | 19.71 |
| PROSTATA | 20 | 14.60 |
| COLO-RECTO | 19 | 13.87 |
| PULMON | 15 | 10.95 |
| ESTOMAGO | 8 | 5.84 |
| OTROS | 48 | 35.04 |
| TOTAL | 137 | |

| COLONIA VALDENSE | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 25 | 29.76 |
| COLO-RECTO | 15 | 17.86 |
| PULMON | 10 | 11.90 |
| PROSTATA | 8 | 9.52 |
| MELANOMA | 4 | 4.76 |
| RIÑON | 3 | 3.57 |
| OTROS | 19 | 22.62 |
| TOTAL | 84 | |

| JUAN LACAZE | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 38 | 20.21 |
| PIEL NO MELANOMA | 28 | 14.89 |
| PULMON | 21 | 11.17 |
| RIÑON | 13 | 6.91 |
| OTROS | 88 | 46.81 |
| TOTAL | 188 | |

| NUEVA HELVECIA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 40 | 22.10 |
| PIEL NO MELANOMA | 29 | 16.02 |
| COLO-RECTO | 28 | 15.47 |
| PULMON | 13 | 7.18 |
| VEJIGA | 11 | 6.08 |
| OTROS | 60 | 33.15 |
| TOTAL | 181 | |

| CONCHILLAS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 25.00 |
| PROSTATA | 3 | 18.75 |
| COLO-RECTO | 2 | 12.50 |
| OTROS | 7 | 43.75 |
| TOTAL | 16 | |

| ROSARIO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 57 | 25.22 |
| PROSTATA | 44 | 19.47 |
| PULMON | 30 | 13.27 |
| COLO-RECTO | 22 | 9.73 |
| VEJIGA | 13 | 5.75 |
| OTROS | 60 | 26.55 |
| TOTAL | 226 | |

| TARARIRAS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 30 | 21.90 |
| PIEL NO MELANOMA | 27 | 19.71 |
| COLO-RECTO | 15 | 10.95 |
| PULMON | 15 | 10.95 |
| RIÑON | 8 | 5.84 |
| OTROS | 42 | 30.66 |
| TOTAL | 137 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 5 | 26.32 |
| COLO-RECTO | 4 | 21.05 |
| PULMON | 2 | 10.53 |
| VEJIGA | 2 | 10.53 |
| OTROS | 6 | 31.58 |
| TOTAL | 19 | |

MUJERES

| COLONIA DEL SACRAMENTO | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 94 | 22.49 |
| MAMA | 87 | 20.81 |
| COLO-RECTO | 54 | 12.92 |
| PANCREAS | 19 | 4.55 |
| PULMON | 16 | 3.83 |
| CUERPO DE UTERO | 14 | 3.35 |
| OTROS | 134 | 32.06 |
| TOTAL | 418 | |

| OMBUES DE LAVALLE | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 6 | 18.18 |
| COLO-RECTO | 5 | 15.15 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 15.15 |
| PANCREAS | 4 | 12.12 |
| OTROS | 13 | 39.39 |
| TOTAL | 33 | |

| ROSARIO | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 40 | 21.74 |
| MAMA | 32 | 17.39 |
| COLO-RECTO | 31 | 16.85 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 8 | 4.35 |
| OTROS | 73 | 39.67 |
| TOTAL | 184 | |

| CARMELO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 64 | 21.77 |
| PIEL NO MELANOMA | 58 | 19.73 |
| COLO-RECTO | 51 | 17.35 |
| PANCREAS | 14 | 4.76 |
| OTROS | 107 | 36.39 |
| TOTAL | 294 | |

| FLORENCIO SANCHEZ | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 35.71 |
| MAMA | 4 | 28.57 |
| COLO-RECTO | 2 | 14.29 |
| OTROS | 3 | 21.43 |
| TOTAL | 14 | |

| TARARIRAS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 24 | 25.53 |
| MAMA | 22 | 23.40 |
| COLO-RECTO | 8 | 8.51 |
| OTROS | 40 | 42.55 |
| TOTAL | 94 | |

| JUAN LACAZE | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 31 | 18.90 |
| MAMA | 24 | 14.63 |
| COLO-RECTO | 20 | 12.20 |
| PULMON | 9 | 5.49 |
| OTROS | 80 | 48.78 |
| TOTAL | 164 | |

| CONCHILLAS | | |
|--------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 2 | |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |

| NUEVA HELVECIA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 35 | 24.82 |
| PIEL NO MELANOMA | 26 | 18.44 |
| COLO-RECTO | 16 | 11.35 |
| ESTOMAGO | 6 | 4.26 |
| PANCREAS | 6 | 4.26 |
| OTROS | 52 | 36.88 |
| TOTAL | 141 | |


| NUEVA PALMIRA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 26 | 23.85 |
| PIEL NO MELANOMA | 19 | 17.43 |
| COLO-RECTO | 12 | 11.01 |
| PULMON | 6 | 5.50 |
| PRIMARIO DESC. | 6 | 5.50 |
| OTROS | 40 | 36.70 |
| TOTAL | 109 | |

| COLONIA VALDENSE | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 30 | 34.48 |
| MAMA | 20 | 22.99 |
| COLO-RECTO | 9 | 10.34 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 4 | 4.60 |
| PULMON | 3 | 3.45 |
| OTROS | 21 | 24.14 |
| TOTAL | 87 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------|-------|---|
| | Casos | % |
| LARINGE | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| VULVA | 1 | |
| RIÑON | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |

DURAZNO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el período | Tasa Esp. | Nº casos en el período | Tasa Esp. |
| 0-4 | 3 | 33.81 | 1 | 11.84 |
| 5-9 | 0 | - | 1 | 9.33 |
| 10-14 | 1 | 7.36 | 2 | 16.38 |
| 15-19 | 1 | 7.90 | 1 | 7.42 |
| 20-24 | 4 | 47.08 | 2 | 24.97 |
| 25-29 | 9 | 105.07 | 3 | 34.40 |
| 30-34 | 11 | 119.88 | 5 | 48.86 |
| 35-39 | 9 | 91.39 | 16 | 169.44 |
| 40-44 | 14 | 172.52 | 24 | 282.75 |
| 45-49 | 14 | 158.28 | 24 | 262.07 |
| 50-54 | 40 | 552.49 | 41 | 518.40 |
| 55-59 | 46 | 595.93 | 47 | 605.36 |
| 60-64 | 81 | 1,341.06 | 51 | 778.74 |
| 65-69 | 118 | 1,985.20 | 49 | 811.39 |
| 70-74 | 111 | 2,404.68 | 58 | 1,065.39 |
| 75-79 | 102 | 2,684.92 | 54 | 1,261.09 |
| 80-84 | 76 | 3,175.93 | 51 | 1,533.84 |
| 85 y más | 59 | 3,696.74 | 47 | 1,549.11 |
| Sin edad | 1 | 1.00 | 0 | |
| Total | 700 | | 477 | |
| Tasa Aj. | | 324.09 | | 209.99 |
| Tasa Bruta | | 505.90 | | 332.98 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PULMON | 116 | 16.57 |
| 2 | PROSTATA | 92 | 13.14 |
| 3 | COLO-RECTO | 67 | 9.57 |
| 4 | VEJIGA | 42 | 6.00 |
| 5 | RIÑÓN | 37 | 5.29 |
| | PRIMARIO DESC. | 27 | 3.86 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 115 | 24.11 |
| 2 | COLO-RECTO | 47 | 9.85 |
| 3 | CUELLO DE UTERO | 32 | 6.71 |
| 4 | PULMON | 24 | 5.03 |
| 5 | RIÑÓN | 21 | 4.40 |
| | PRIMARIO DESC. | 16 | 3.35 |



DURAZNO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE DURAZNO | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 71 | 15.43 |
| PULMON | 66 | 14.35 |
| PIEL NO MELANOMA | 58 | 12.61 |
| COLO-RECTO | 47 | 10.22 |
| VEJIGA | 29 | 6.30 |
| RIÑON | 21 | 4.57 |
| OTROS | 168 | 36.52 |
| TOTAL | 460 | |

| BLANQUILLO | | |
|------------|-------|--|
| | Casos | |
| PROSTATA | 2 | |
| HIGADO | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| VEJIGA | 1 | |
| LEUCEMIA | 1 | |

| CARMEN | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 5 | 18.52 |
| PRIMARIO DESC. | 4 | 14.81 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 3 | 11.11 |
| ESOFAGO | 3 | 11.11 |
| PROSTATA | 3 | 11.11 |
| OTROS | 9 | 33.33 |
| TOTAL | 27 | |

| SANTA BERNARDINA | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |

| CERRO CHATO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 12 | 30.77 |
| PROSTATA | 6 | 15.38 |
| ESTOMAGO | 3 | 7.69 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 7.69 |
| RIÑON | 3 | 7.69 |
| COLO-RECTO | 2 | 5.13 |
| OTROS | 10 | 25.64 |
| TOTAL | 39 | |

| LA PALOMA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 5 | 27.78 |
| ESTOMAGO | 2 | 11.11 |
| COLO-RECTO | 2 | 11.11 |
| HIGADO | 2 | 11.11 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 11.11 |
| OTRAS | 5 | 27.78 |
| TOTAL | 18 | |

| SARANDI DEL YI | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 19 | 25.33 |
| COLO-RECTO | 8 | 10.67 |
| PROSTATA | 8 | 10.67 |
| RIÑON | 7 | 9.33 |
| OTROS | 33 | 44.00 |
| TOTAL | 75 | |

| CARLOS REYLES | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| PULMON | 2 | |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 2 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| INTESTINO DELGADO | 1 | |
| PROSTATA | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| PANCREAS | 1 | |
| DIGESTIVO S/E | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| MELANOMA | 1 | |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

Incluye casos de Durazno, Florida y Treinta y Tres

MUJERES

| CIUDAD DE DURAZNO | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 77 | 23.62 |
| PIEL NO MELANOMA | 40 | 12.27 |
| COLO-RECTO | 34 | 10.43 |
| CUELLO DE UTERO | 22 | 6.75 |
| PULMON | 18 | 5.52 |
| RIÑON | 14 | 4.29 |
| OVARIO | 12 | 3.68 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 12 | 3.68 |
| OTROS | 97 | 29.75 |
| TOTAL | 326 | |

| SARANDI DEL YI | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 14 | 21.54 |
| CUELLO DE UTERO | 7 | 10.77 |
| COLO-RECTO | 6 | 9.23 |
| LEUCEMIA | 5 | 7.69 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 4 | 6.15 |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 6.15 |
| OTROS | 25 | 38.46 |
| TOTAL | 65 | |

| CARLOS REYLES | | |
|--------------------|-------|--|
| | Casos | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| CUERPO DE UTERO | 1 | |
| MIELOMA | 1 | |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | |

| CARMEN | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 7 | 33.33 |
| COLO-RECTO | 2 | 9.52 |
| CUELLO DE UTERO | 2 | 9.52 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 9.52 |
| OTROS | 8 | 38.10 |
| TOTAL | 21 | |

| BLANQUILLO | | |
|------------|-------|--|
| | Casos | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| OVARIO | 1 | |

| CERRO CHATO | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 6 | 26.09 |
| PULMON | 2 | 8.70 |
| PANCREAS | 2 | 8.70 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 2 | 8.70 |
| OVARIO | 2 | 8.70 |
| OTROS | 9 | 39.13 |
| TOTAL | 23 | |

| SANTA BERNARDINA | | |
|------------------|-------|--|
| | Casos | |
| PANCREAS | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| UTERO S/E | 1 | |
| RIÑON | 1 | |


| LA PALOMA | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| HIGADO | 1 | |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

Incluye casos de Durazno, Florida y Treinta y Tres

| ZONA RURAL | | |
|--------------------|-------|--|
| | Casos | |
| MAMA | 2 | |
| ESOFAGO | 1 | |
| DIGESTIVO S/E | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| LINFOMA DE HODGKIN | 1 | |

FLORES


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 1 | 29.33 | 1 | 26.72 |
| 5-9 | 0 | - | 1 | 20.07 |
| 10-14 | 1 | 18.98 | 1 | 20.41 |
| 15-19 | 0 | - | 0 | - |
| 20-24 | 1 | 23.42 | 0 | - |
| 25-29 | 1 | 29.40 | 2 | 56.74 |
| 30-34 | 4 | 103.87 | 4 | 88.13 |
| 35-39 | 3 | 63.84 | 5 | 120.51 |
| 40-44 | 5 | 122.22 | 20 | 482.16 |
| 45-49 | 7 | 176.95 | 21 | 547.02 |
| 50-54 | 19 | 521.41 | 23 | 554.35 |
| 55-59 | 32 | 893.85 | 25 | 695.22 |
| 60-64 | 35 | 1,071.98 | 23 | 797.23 |
| 65-69 | 36 | 1,322.07 | 26 | 928.90 |
| 70-74 | 64 | 2,820.63 | 42 | 1,549.82 |
| 75-79 | 48 | 3,030.30 | 38 | 1,563.79 |
| 80-84 | 42 | 3,921.57 | 35 | 1,922.02 |
| 85 y más | 42 | 4,994.06 | 30 | 1,610.31 |
| Sin edad | 0 | - | 0 | - |
| Total | 341 | | 297 | |
| Tasa Aj. | | 313.12 | | 265.44 |
| Tasa Bruta | | 553.54 | | 467.49 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 70 | 20.53 |
| 2 | PULMON | 40 | 11.73 |
| 3 | COLO-RECTO | 29 | 8.50 |
| 4 | VEJIGA | 29 | 8.50 |
| 5 | RIÑON | 20 | 5.87 |
| | PRIMARIO DESC. | 7 | 2.05 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 98 | 33.00 |
| 2 | COLO-RECTO | 23 | 7.74 |
| 3 | CUELLO DE UTERO | 16 | 5.39 |
| 4 | TIROIDES | 14 | 4.71 |
| 5 | ESTOMAGO | 11 | 3.70 |
| | PRIMARIO DESC. | 9 | 3.03 |



FLORES

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| TRINIDAD | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 64 | 20.92 |
| PIEL NO MELANOMA | 46 | 15.03 |
| PULMON | 39 | 12.75 |
| VEJIGA | 27 | 8.82 |
| COLO-RECTO | 26 | 8.50 |
| RIÑON | 18 | 5.88 |
| PANCREAS | 16 | 5.23 |
| OTROS | 70 | 22.88 |
| TOTAL | 306 | |

| ANDRESITO | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |

| CERRO COLORADO | | |
|----------------|-------|--|
| | Casos | |
| COLO-RECTO | 1 | |

| ISMAEL CORTINAS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 28.57 |
| ESOFAGO | 2 | 14.29 |
| ESTOMAGO | 2 | 14.29 |
| PROSTATA | 2 | 14.29 |
| OTROS | 4 | 28.57 |
| TOTAL | 14 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------|-------|--|
| | Casos | |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| PROSTATA | 1 | |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | |

MUJERES

| TRINIDAD | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 81 | 30.11 |
| PIEL NO MELANOMA | 44 | 16.36 |
| COLO-RECTO | 22 | 8.18 |
| CUELLO DE UTERO | 15 | 5.58 |
| TIROIDES | 13 | 4.83 |
| PANCREAS | 10 | 3.72 |
| OTROS | 84 | 31.23 |
| TOTAL | 269 | |

| ANDRESITO | | |
|------------|-------|--|
| | Casos | |
| COLO-RECTO | 1 | |


| CERRO COLORADO | | |
|----------------|-------|--|
| | Casos | |
| MAMA | 1 | |
| OVARIO | 1 | |

| ISMAEL CORTINAS | | |
|-----------------|-------|--|
| | Casos | |
| MAMA | 5 | |
| CUELLO DE UTERO | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|-----------------|-------|--|
| | Casos | |
| MAMA | 6 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| CUERPO DE UTERO | 1 | |

FLORIDA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el período | Tasa Esp. | Nº casos en el período | Tasa Esp. |
| 0-4 | 3 | 27.95 | 2 | 20.57 |
| 5-9 | 2 | 16.13 | 1 | 8.54 |
| 10-14 | 1 | 7.33 | 1 | 7.36 |
| 15-19 | 1 | 6.97 | 3 | 22.62 |
| 20-24 | 3 | 30.06 | 1 | 10.16 |
| 25-29 | 6 | 60.27 | 5 | 52.18 |
| 30-34 | 5 | 43.89 | 10 | 80.66 |
| 35-39 | 8 | 72.89 | 15 | 139.24 |
| 40-44 | 9 | 91.05 | 33 | 311.29 |
| 45-49 | 19 | 196.57 | 36 | 334.88 |
| 50-54 | 46 | 463.85 | 29 | 293.55 |
| 55-59 | 71 | 825.49 | 42 | 445.53 |
| 60-64 | 93 | 1,169.22 | 67 | 762.32 |
| 65-69 | 93 | 1,291.49 | 74 | 1,030.07 |
| 70-74 | 124 | 2,080.89 | 67 | 1,005.70 |
| 75-79 | 113 | 2,678.36 | 58 | 860.66 |
| 80-84 | 80 | 2,665.78 | 84 | 1,628.22 |
| 85 y más | 72 | 3,076.92 | 66 | 1,445.47 |
| Sin edad | 0 | | 0 | |
| Total | 749 | | 594 | |
| Tasa Aj. | | 276.58 | | 200.95 |
| Tasa Bruta | | 461.84 | | 348.12 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 152 | 20.29 |
| 2 PULMON | 118 | 15.75 |
| 3 COLO-RECTO | 67 | 8.95 |
| 4 VEJIGA | 37 | 4.94 |
| 5 ESTOMAGO | 36 | 4.81 |
| PRIMARIO DESC. | 28 | 3.74 |



| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 172 | 28.96 |
| 2 COLO-RECTO | 63 | 10.61 |
| 3 PANCREAS | 36 | 6.06 |
| 4 OVARIO | 26 | 4.38 |
| 5 CUELLO DE UTERO | 25 | 4.21 |
| PRIMARIO DESC. | 26 | 4.38 |



FLORIDA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE FLORIDA | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 82 | 19.66 |
| PULMON | 63 | 15.11 |
| COLO-RECTO | 40 | 9.59 |
| PIEL NO MELANOMA | 40 | 9.59 |
| VEJIGA | 22 | 5.28 |
| ESTOMAGO | 20 | 4.80 |
| LEUCEMIA | 19 | 4.56 |
| OTROS | 131 | 31.41 |
| TOTAL | 417 | |

| CERRO COLORADO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 4 | 33.33 |
| PROSTATA | 3 | 25.00 |
| ESTOMAGO | 2 | 16.67 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 16.67 |
| COLO-RECTO | 1 | 8.33 |
| TOTAL | 12 | |

| 25 DE MAYO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 5 | 23.81 |
| COLO-RECTO | 3 | 14.29 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 14.29 |
| ESTOMAGO | 2 | 9.52 |
| PULMON | 2 | 9.52 |
| OTROS | 6 | 28.57 |
| TOTAL | 21 | |

| SARANDI GRANDE | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 23 | 23.47 |
| COLO-RECTO | 12 | 12.24 |
| PULMON | 11 | 11.22 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 7 | 7.14 |
| PIEL NO MELANOMA | 7 | 7.14 |
| ESTOMAGO | 6 | 6.12 |
| LARINGE | 5 | 5.10 |
| OTROS | 27 | 27.55 |
| TOTAL | 98 | |

| FRAY MARCOS | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 8 | 22.86 |
| PROSTATA | 6 | 17.14 |
| PRIMARIO DESC. | 5 | 14.29 |
| COLO-RECTO | 4 | 11.43 |
| PANCREAS | 2 | 5.71 |
| DIGESTIVO S/E | 2 | 5.71 |
| LARINGE | 2 | 5.71 |
| OTROS | 6 | 17.14 |
| TOTAL | 35 | |

| CERRO CHATO | | |
|----------------------------|--|--|
| Datos agrupados en Durazno | | |

| CARDAL | | |
|----------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 8 | 53.33 |
| VEJIGA | 2 | 13.33 |
| OTROS | 5 | 33.33 |
| TOTAL | 15 | |

| CASUPA | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 8 | 25.81 |
| PANCREAS | 3 | 9.68 |
| PROSTATA | 3 | 9.68 |
| VEJIGA | 3 | 9.68 |
| PRIMARIO DESC. | 3 | 9.68 |
| OTROS | 11 | 35.48 |
| TOTAL | 31 | |

| 25 DE AGOSTO | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 4 | 23.53 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 3 | 17.65 |
| COLO-RECTO | 2 | 11.76 |
| VEJIGA | 2 | 11.76 |
| PRIMARIO DESC. | 2 | 11.76 |
| OTROS | 4 | 23.53 |
| TOTAL | 17 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 6 | 31.58 |
| PULMON | 4 | 21.05 |
| OTROS | 9 | 47.37 |
| TOTAL | 19 | |

MUJERES

| CIUDAD DE FLORIDA | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 105 | 28.30 |
| COLO-RECTO | 35 | 9.43 |
| PIEL NO MELANOMA | 24 | 6.47 |
| PANCREAS | 22 | 5.93 |
| CUELLO DE UTERO | 18 | 4.85 |
| OVARIO | 18 | 4.85 |
| PRIMARIO DESC. | 15 | 4.04 |
| OTROS | 134 | 36.12 |
| TOTAL | 371 | |

| CERRO COLORADO | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 3 | 23.08 |
| COLO-RECTO | 2 | 15.38 |
| OTROS | 8 | 61.54 |
| TOTAL | 13 | |

| 25 DE MAYO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 8 | 40.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 20.00 |
| COLO-RECTO | 2 | 10.00 |
| TIROIDES | 2 | 10.00 |
| OTROS | 4 | 20.00 |
| TOTAL | 20 | |

| SARANDI GRANDE | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 13 | 24.07 |
| COLO-RECTO | 7 | 12.96 |
| PANCREAS | 5 | 9.26 |
| PRIMARIO DESC. | 4 | 7.41 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 4 | 7.41 |
| OVARIO | 3 | 5.56 |
| OTROS | 18 | 33.33 |
| TOTAL | 54 | |

| CERRO CHATO | | |
|----------------------------|--|--|
| Datos agrupados en Durazno | | |

| 25 DE AGOSTO | | |
|------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 3 | |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| CUERPO DE UTERO | 1 | |

| CARDAL | | |
|--------------------|-------|--|
| | Casos | |
| COLO-RECTO | 2 | |
| PANCREAS | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| MELANOMA | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| VAGINA | 1 | |
| OVARIO | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | |


| CASUPA | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 7 | 31.82 |
| COLO-RECTO | 4 | 18.18 |
| PRIMARIO DESC. | 2 | 9.09 |
| OTROS | 9 | 40.91 |
| TOTAL | 22 | |

| FRAY MARCOS | | |
|------------------|-------|--|
| | Casos | |
| COLO-RECTO | 2 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| OVARIO | 1 | |
| RIÑON | 1 | |
| VEJIGA | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| MAMA | 5 | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| CUELLO DE UTERO | 1 | |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | |
| LINFOMA DE HODGKIN | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

LAVALLEJA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 1 | 12.34 | 1 | 12.33 |
| 5-9 | 3 | 30.54 | 0 | - |
| 10-14 | 1 | 8.28 | 1 | 8.55 |
| 15-19 | 1 | 8.06 | 2 | 18.37 |
| 20-24 | 6 | 68.88 | 5 | 61.68 |
| 25-29 | 4 | 50.35 | 8 | 101.65 |
| 30-34 | 8 | 92.58 | 7 | 72.76 |
| 35-39 | 10 | 110.89 | 20 | 221.07 |
| 40-44 | 16 | 178.99 | 21 | 220.80 |
| 45-49 | 21 | 214.72 | 49 | 486.01 |
| 50-54 | 57 | 637.16 | 61 | 621.88 |
| 55-59 | 72 | 914.87 | 45 | 573.10 |
| 60-64 | 111 | 1,588.89 | 77 | 980.64 |
| 65-69 | 150 | 2,228.50 | 88 | 1,180.10 |
| 70-74 | 141 | 2,682.14 | 93 | 1,381.87 |
| 75-79 | 113 | 2,698.83 | 108 | 2,005.94 |
| 80-84 | 90 | 2,833.75 | 106 | 2,128.94 |
| 85 y más | 99 | 4,755.04 | 105 | 2,255.64 |
| Sin edad | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 |
| Total | 907 | | 799 | |
| Tasa Aj. | | 368.81 | | 275.27 |
| Tasa Bruta | | 644.75 | | 536.68 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 144 | 15.88 |
| 2 PULMON | 134 | 14.77 |
| 3 COLO-RECTO | 101 | 11.14 |
| 4 PANCREAS | 43 | 4.74 |
| 5 ESTOMAGO | 39 | 4.30 |
| PRIMARIO DESC. | 17 | 1.87 |



| Mujeres | Casos | % |
|----------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 169 | 21.15 |
| 2 COLO-RECTO | 94 | 11.76 |
| 3 PULMON | 39 | 4.88 |
| 4 PANCREAS | 34 | 4.26 |
| 5 LINFOMA NO HODGKIN | 29 | 3.63 |
| PRIMARIO DESC. | 37 | 4.63 |



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| MINAS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 103 | 17.34 |
| PULMON | 90 | 15.15 |
| PROSTATA | 89 | 14.98 |
| COLO-RECTO | 64 | 10.77 |
| ESTOMAGO | 30 | 5.05 |
| PANCREAS | 27 | 4.55 |
| VEJIGA | 23 | 3.87 |
| OTROS | 168 | 28.28 |
| TOTAL | 594 | |

| JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | | |
|-----------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 6 | 15.79 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 13.16 |
| COLO-RECTO | 4 | 10.53 |
| PANCREAS | 3 | 7.89 |
| PROSTATA | 3 | 7.89 |
| RIÑON | 3 | 7.89 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 3 | 7.89 |
| OTROS | 11 | 28.95 |
| TOTAL | 38 | |

| ZAPICAN | | |
|------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 3 | |
| PROSTATA | 2 | |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | |
| OTROS | 3 | |
| TOTAL | 10 | |

| MARISCALA | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 6 | 23.08 |
| COLO-RECTO | 5 | 19.23 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 11.54 |
| PANCREAS | 2 | 7.69 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 2 | 7.69 |
| OTROS | 8 | 30.77 |
| TOTAL | 26 | |

| PIRARAJA | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 7 | 43.75 |
| PULMON | 4 | 25.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 12.50 |
| HIGADO | 1 | 6.25 |
| CAVIDAD NASAL, OIDO MEDIO Y SENOS | 1 | 6.25 |
| LARINGE | 1 | 6.25 |
| TOTAL | 16 | |

| SOLIS DE MATAOJO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 10 | 24.39 |
| PROSTATA | 7 | 17.07 |
| PULMON | 6 | 14.63 |
| COLO-RECTO | 3 | 7.32 |
| PANCREAS | 3 | 7.32 |
| OTROS | 12 | 29.27 |
| TOTAL | 41 | |

| JOSE PEDRO VARELA | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 9 | 17.31 |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 15.38 |
| PROSTATA | 7 | 13.46 |
| COLO-RECTO | 5 | 9.62 |
| VEJIGA | 5 | 9.62 |
| PANCREAS | 3 | 5.77 |
| OTROS | 15 | 28.85 |
| TOTAL | 52 | |

| VILLA DEL ROSARIO | | |
|------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | |
| PROSTATA | 3 | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 18 | 25.35 |
| PIEL NO MELANOMA | 14 | 19.72 |
| COLO-RECTO | 8 | 11.27 |
| PULMON | 7 | 9.86 |
| VEJIGA | 4 | 5.63 |
| PANCREAS | 3 | 4.23 |
| LARINGE | 3 | 4.23 |
| OTROS | 14 | 19.72 |
| TOTAL | 71 | |

MUJERES

| MINAS | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 123 | 21.81 |
| PIEL NO MELANOMA | 84 | 14.89 |
| COLO-RECTO | 71 | 12.59 |
| PRIMARIO DESC. | 29 | 5.14 |
| PANCREAS | 24 | 4.26 |
| OVARIO | 22 | 3.90 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 22 | 3.90 |
| OTROS | 189 | 33.51 |
| TOTAL | 564 | |

| JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | | |
|-----------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 5 | 26.32 |
| MAMA | 3 | 15.79 |
| CUELLO DE UTERO | 2 | 10.53 |
| OTROS | 9 | 47.37 |
| TOTAL | 19 | |

| ZAPICAN | | |
|----------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |

| MARISCALA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 7 | 19.44 |
| PULMON | 4 | 11.11 |
| MAMA | 4 | 11.11 |
| COLO-RECTO | 3 | 8.33 |
| PRIMARIO DESC. | 3 | 8.33 |
| OTROS | 15 | 41.67 |
| TOTAL | 36 | |

| PIRARAJA | | |
|------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| TIROIDES | 2 | |
| HIGADO | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| VEJIGA | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| SOLIS DE MATAOJO | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 7 | 20.59 |
| MAMA | 7 | 20.59 |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 4 | 11.76 |
| ESTOMAGO | 3 | 8.82 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 8.82 |
| OTROS | 10 | 29.41 |
| TOTAL | 34 | |


| JOSE PEDRO VARELA | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 12 | 26.67 |
| COLO-RECTO | 6 | 13.33 |
| PULMON | 4 | 8.89 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 6.67 |
| OTROS | 20 | 44.44 |
| TOTAL | 45 | |

| VILLA DEL ROSARIO | | |
|-------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 2 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| MELANOMA | 1 | |
| UTERO S/E | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 14 | 36.84 |
| MAMA | 4 | 10.53 |
| TIROIDES | 3 | 7.89 |
| OTROS | 17 | 44.74 |
| TOTAL | 38 | |

MALDONADO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el período | Tasa Esp. | Nº casos en el período | Tasa Esp. |
| 0-4 | 6 | 20.90 | 7 | 25.50 |
| 5-9 | 6 | 18.86 | 3 | 9.50 |
| 10-14 | 4 | 10.71 | 5 | 14.77 |
| 15-19 | 7 | 18.72 | 4 | 11.26 |
| 20-24 | 6 | 18.37 | 6 | 19.00 |
| 25-29 | 14 | 43.54 | 13 | 43.91 |
| 30-34 | 19 | 59.69 | 23 | 68.14 |
| 35-39 | 41 | 125.63 | 55 | 166.27 |
| 40-44 | 42 | 141.79 | 100 | 340.73 |
| 45-49 | 52 | 186.42 | 110 | 380.65 |
| 50-54 | 139 | 527.77 | 154 | 576.97 |
| 55-59 | 181 | 895.77 | 156 | 713.05 |
| 60-64 | 243 | 1,350.45 | 201 | 1,005.20 |
| 65-69 | 301 | 1,987.19 | 228 | 1,268.85 |
| 70-74 | 339 | 3,125.00 | 232 | 1,571.50 |
| 75-79 | 277 | 3,408.81 | 183 | 1,581.54 |
| 80-84 | 152 | 2,722.06 | 200 | 2,195.15 |
| 85 y más | 152 | 4,716.10 | 165 | 2,365.93 |
| Sin edad | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 |
| Total | 1983 | | 1846 | |
| Tasa Aj. | | 352.44 | | 274.43 |
| Tasa Bruta | | 461.69 | | 416.11 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 364 | 18.36 |
| 2 | PULMON | 266 | 13.41 |
| 3 | COLO-RECTO | 229 | 11.55 |
| 4 | VEJIGA | 103 | 5.19 |
| 5 | RIÑON | 70 | 3.53 |
| | PRIMARIO DESC. | 59 | 2.98 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 492 | 26.65 |
| 2 | COLO-RECTO | 214 | 11.59 |
| 3 | PULMON | 105 | 5.69 |
| 4 | CUELLO DE UTERO | 69 | 3.74 |
| 5 | PANCREAS | 68 | 3.68 |
| | PRIMARIO DESC. | 41 | 2.22 |



MALDONADO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE MALDONADO | | |
|---------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 151 | 16.97 |
| PIEL NO MELANOMA | 137 | 15.39 |
| PULMON | 114 | 12.81 |
| COLO-RECTO | 105 | 11.80 |
| VEJIGA | 48 | 5.39 |
| ESTOMAGO | 36 | 4.04 |
| OTROS | 299 | 33.60 |
| TOTAL | 890 | |

| SAN CARLOS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 68 | 19.71 |
| PULMON | 56 | 16.23 |
| PIEL NO MELANOMA | 52 | 15.07 |
| COLO-RECTO | 35 | 10.14 |
| PANCREAS | 19 | 5.51 |
| RIÑON | 17 | 4.93 |
| OTROS | 98 | 28.41 |
| TOTAL | 345 | |

| PUNTA DEL ESTE | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 32 | 25.40 |
| PIEL NO MELANOMA | 29 | 23.02 |
| COLO-RECTO | 12 | 9.52 |
| PULMON | 10 | 7.94 |
| VEJIGA | 7 | 5.56 |
| OTROS | 36 | 28.57 |
| TOTAL | 126 | |

MUJERES

| CIUDAD DE MALDONADO | | |
|---------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 240 | 27.24 |
| PIEL NO MELANOMA | 133 | 15.10 |
| COLO-RECTO | 97 | 11.01 |
| PULMON | 45 | 5.11 |
| PANCREAS | 35 | 3.97 |
| CUELLO DE UTERO | 31 | 3.52 |
| TIROIDES | 30 | 3.41 |
| ESTOMAGO | 29 | 3.29 |
| OTROS | 241 | 27.36 |
| TOTAL | 881 | |

| SAN CARLOS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 78 | 24.76 |
| PIEL NO MELANOMA | 49 | 15.56 |
| COLO-RECTO | 35 | 11.11 |
| PULMON | 22 | 6.98 |
| PANCREAS | 11 | 3.49 |
| RIÑON | 11 | 3.49 |
| TIROIDES | 11 | 3.49 |
| OTROS | 98 | 31.11 |
| TOTAL | 315 | |

| PINARES - LAS DELICIAS | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 29.63 |
| MAMA | 6 | 22.22 |
| COLO-RECTO | 5 | 18.52 |
| OTROS | 8 | 29.63 |
| TOTAL | 27 | |

| AIGUA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 11 | 22.00 |
| PROSTATA | 9 | 18.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 9 | 18.00 |
| COLO-RECTO | 7 | 14.00 |
| PRIMARIO DESC. | 3 | 6.00 |
| ESTOMAGO | 2 | 4.00 |
| OTROS | 9 | 18.00 |
| TOTAL | 50 | |

| PINARES - LAS DELICIAS | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 7 | 31.82 |
| PULMON | 3 | 13.64 |
| PROSTATA | 3 | 13.64 |
| OTROS | 9 | 40.91 |
| TOTAL | 22 | |

| CERRO PELADO | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 5 | 33.33 |
| PRIMARIO DESC. | 3 | 20.00 |
| OTROS | 7 | 46.67 |
| TOTAL | 15 | |

| GREGORIO AZNARES | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 4 | 28.57 |
| PANCREAS | 2 | 14.29 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 14.29 |
| OTROS | 6 | 42.86 |
| TOTAL | 14 | |

| PAN DE AZUCAR | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 15 | 20.55 |
| COLO-RECTO | 11 | 15.07 |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 10.96 |
| VEJIGA | 7 | 9.59 |
| PANCREAS | 5 | 6.85 |
| PULMON | 4 | 5.48 |
| OVARIO | 4 | 5.48 |
| OTROS | 19 | 26.03 |
| TOTAL | 73 | |

| PIRIAPOLIS | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 43 | 30.50 |
| PIEL NO MELANOMA | 22 | 15.60 |
| COLO-RECTO | 21 | 14.89 |
| VEJIGA | 8 | 5.67 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 7 | 4.96 |
| PULMON | 5 | 3.55 |
| OTROS | 35 | 24.82 |
| TOTAL | 141 | |

| PUNTA DEL ESTE | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 37 | 28.03 |
| MAMA | 30 | 22.73 |
| COLO-RECTO | 17 | 12.88 |
| PULMON | 9 | 6.82 |
| CUELLO DE UTERO | 5 | 3.79 |
| OTROS | 34 | 25.76 |
| TOTAL | 132 | |

| PAN DE AZUCAR | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 26 | 23.21 |
| PIEL NO MELANOMA | 16 | 14.29 |
| COLO-RECTO | 15 | 13.39 |
| PULMON | 14 | 12.50 |
| RIÑON | 6 | 5.36 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 4 | 3.57 |
| ESTOMAGO | 4 | 3.57 |
| VEJIGA | 4 | 3.57 |
| OTROS | 23 | 20.54 |
| TOTAL | 112 | |

| PIRIAPOLIS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 32 | 21.19 |
| PIEL NO MELANOMA | 26 | 17.22 |
| COLO-RECTO | 22 | 14.57 |
| PULMON | 12 | 7.95 |
| OTROS | 59 | 39.07 |
| TOTAL | 151 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 7 | 25.93 |
| PIEL NO MELANOMA | 7 | 25.93 |
| PULMON | 3 | 11.11 |
| VEJIGA | 3 | 11.11 |
| OTROS | 7 | 25.93 |
| TOTAL | 27 | |

| GREGORIO AZNARES | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 4 | 26.67 |
| PANCREAS | 2 | 13.33 |
| PULMON | 2 | 13.33 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 13.33 |
| OTROS | 5 | 33.33 |
| TOTAL | 15 | |


| AIGUA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 14 | 30.43 |
| PIEL NO MELANOMA | 11 | 23.91 |
| CUELLO DE UTERO | 7 | 15.22 |
| PULMON | 4 | 8.70 |
| OTROS | 10 | 21.74 |
| TOTAL | 46 | |

| CERRO PELADO | | |
|--------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 9 | 39.13 |
| PULMON | 4 | 17.39 |
| COLO-RECTO | 2 | 8.70 |
| TIROIDES | 2 | 8.70 |
| OTROS | 6 | 26.09 |
| TOTAL | 23 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 3 | 23.08 |
| MAMA | 2 | 15.38 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 15.38 |
| OTROS | 6 | 46.15 |
| TOTAL | 13 | |

PAYSANDU


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 6 | 31.67 | 2 | 10.44 |
| 5-9 | 2 | 8.72 | 2 | 9.60 |
| 10-14 | 2 | 7.48 | 3 | 11.79 |
| 15-19 | 3 | 12.14 | 4 | 15.75 |
| 20-24 | 5 | 24.47 | 6 | 30.90 |
| 25-29 | 8 | 42.30 | 15 | 80.26 |
| 30-34 | 20 | 109.22 | 14 | 73.17 |
| 35-39 | 20 | 108.19 | 28 | 145.84 |
| 40-44 | 23 | 138.86 | 57 | 334.78 |
| 45-49 | 34 | 230.06 | 55 | 353.15 |
| 50-54 | 66 | 435.82 | 56 | 330.75 |
| 55-59 | 92 | 627.09 | 95 | 625.16 |
| 60-64 | 152 | 1,311.93 | 103 | 762.96 |
| 65-69 | 142 | 1,343.68 | 104 | 872.78 |
| 70-74 | 204 | 2,532.90 | 124 | 1,209.64 |
| 75-79 | 144 | 2,219.14 | 117 | 1,168.25 |
| 80-84 | 130 | 2,807.78 | 130 | 1,842.40 |
| 85 y más | 75 | 2,680.49 | 89 | 1,550.25 |
| Sin edad | 1 | 1.00 | 0 | |
| Total | 1129 | | 1004 | |
| Tasa Aj. | | 286.91 | | 219.09 |
| Tasa Bruta | | 410.91 | | 345.63 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 199 | 17.63 |
| 2 | COLO-RECTO | 140 | 12.40 |
| 3 | PULMON | 131 | 11.60 |
| 4 | ESTOMAGO | 62 | 5.49 |
| 5 | VEJIGA | 55 | 4.87 |
| | PRIMARIO DESC. | 48 | 4.25 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 246 | 24.50 |
| 2 | COLO-RECTO | 155 | 15.44 |
| 3 | CUELLO DE UTERO | 60 | 5.98 |
| 4 | ESTOMAGO | 39 | 3.88 |
| 5 | PANCREAS | 38 | 3.78 |
| | PRIMARIO DESC. | 33 | 3.29 |



PAYSANDU

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE PAYSANDU | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 159 | 17.38 |
| PIEL NO MELANOMA | 117 | 12.79 |
| COLO-RECTO | 115 | 12.57 |
| PULMON | 103 | 11.26 |
| ESTOMAGO | 47 | 5.14 |
| VEJIGA | 46 | 5.03 |
| OTROS | 328 | 35.85 |
| TOTAL | 915 | |

| PORVENIR | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 6 | 35.29 |
| PROSTATA | 4 | 23.53 |
| MELANOMA | 2 | 11.76 |
| OTROS | 5 | 29.41 |
| TOTAL | 17 | |

| PIEDRAS COLORADAS | | |
|--------------------|-------|--|
| | Casos | |
| VEJIGA | 2 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| PANCREAS | 1 | |
| HUESO | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | |
| TOTAL | 7 | |

| GUICHON | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 9 | 18.75 |
| PROSTATA | 8 | 16.67 |
| COLO-RECTO | 6 | 12.50 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 10.42 |
| ESTOMAGO | 3 | 6.25 |
| PANCREAS | 3 | 6.25 |
| OTROS | 14 | 29.17 |
| TOTAL | 48 | |

| SAN FELIX | | |
|------------------------|-------|--|
| | Casos | |
| PULMON | 2 | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| LARINGE | 1 | |
| RIÑON | 1 | |
| TOTAL | 6 | |

| TAMBORES | | |
|-------------------------------|--|--|
| Datos agrupados en Tacuarembó | | |

| NUEVO PAYSANDU | | |
|----------------|-------|--|
| | Casos | |
| COLO-RECTO | 2 | |
| PULMON | 2 | |
| OTROS | 3 | |
| TOTAL | 7 | |

| QUEBRACHO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 30.77 |
| PROSTATA | 5 | 19.23 |
| PULMON | 4 | 15.38 |
| ESTOMAGO | 3 | 11.54 |
| OTROS | 6 | 23.08 |
| TOTAL | 26 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 10 | 21.74 |
| PROSTATA | 9 | 19.57 |
| PULMON | 6 | 13.04 |
| COLO-RECTO | 4 | 8.70 |
| OTROS | 17 | 36.96 |
| TOTAL | 46 | |

MUJERES

| CIUDAD DE PAYSANDU | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 217 | 25.68 |
| COLO-RECTO | 130 | 15.38 |
| PIEL NO MELANOMA | 98 | 11.60 |
| CUELLO DE UTERO | 47 | 5.56 |
| PANCREAS | 32 | 3.79 |
| ESTOMAGO | 31 | 3.67 |
| TIROIDES | 30 | 3.55 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 30 | 3.55 |
| OTROS | 230 | 27.22 |
| TOTAL | 845 | |

| PORVENIR | | |
|------------------|-------|--|
| | Casos | |
| MAMA | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| CUERPO DE UTERO | 1 | |
| VEJIGA | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| QUEBRACHO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 5 | 29.41 |
| MAMA | 3 | 17.65 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 17.65 |
| OTROS | 6 | 35.29 |
| TOTAL | 17 | |

| GUICHON | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 8 | 19.51 |
| MAMA | 6 | 14.63 |
| CUELLO DE UTERO | 3 | 7.32 |
| PRIMARIO DESC. | 3 | 7.32 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 7.32 |
| OTROS | 18 | 43.90 |
| TOTAL | 41 | |

| PIEDRAS COLORADAS | | |
|-------------------|-------|--|
| | Casos | |
| MAMA | 3 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| HUESO | 1 | |


| TAMBORES | | |
|-------------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| Datos agrupados en Tacuarembó | | |

| SAN FELIX | | |
|------------------|-------|--|
| | Casos | |
| COLO-RECTO | 2 | |
| ESOFAGO | 1 | |
| PANCREAS | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| OVARIO | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 24.24 |
| COLO-RECTO | 6 | 18.18 |
| MAMA | 6 | 18.18 |
| ESTOMAGO | 2 | 6.06 |
| CUELLO DE UTERO | 2 | 6.06 |
| TIROIDES | 2 | 6.06 |
| OTROS | 7 | 21.21 |
| TOTAL | 33 | |

RIO NEGRO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 4 | 35.93 | 1 | 9.84 |
| 5-9 | 0 | - | 1 | 9.31 |
| 10-14 | 2 | 14.93 | 0 | - |
| 15-19 | 3 | 24.43 | 1 | 8.17 |
| 20-24 | 2 | 23.08 | 2 | 24.46 |
| 25-29 | 6 | 66.22 | 5 | 58.28 |
| 30-34 | 5 | 49.50 | 12 | 114.55 |
| 35-39 | 7 | 72.15 | 21 | 218.34 |
| 40-44 | 6 | 70.54 | 24 | 278.75 |
| 45-49 | 11 | 143.88 | 34 | 446.55 |
| 50-54 | 37 | 483.66 | 47 | 700.55 |
| 55-59 | 58 | 863.74 | 43 | 592.61 |
| 60-64 | 59 | 946.27 | 58 | 890.53 |
| 65-69 | 81 | 1,625.53 | 56 | 1,056.21 |
| 70-74 | 93 | 2,339.03 | 56 | 1,221.37 |
| 75-79 | 85 | 2,763.33 | 60 | 1,622.06 |
| 80-84 | 68 | 3,492.55 | 42 | 1,552.11 |
| 85 y más | 53 | 4,257.03 | 45 | 1,734.77 |
| Sin edad | 2 | 2.00 | 0 | - |
| Total | 582 | | 508 | |
| Tasa Aj. | | 293.67 | | 256.08 |
| Tasa Bruta | | 422.78 | | 368.57 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 98 | 16.84 |
| 2 | PULMON | 69 | 11.86 |
| 3 | COLO-RECTO | 57 | 9.79 |
| 4 | ESTOMAGO | 36 | 6.19 |
| 5 | RIÑON | 26 | 4.47 |
| | PRIMARIO DESC. | 17 | 2.92 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 128 | 25.20 |
| 2 | COLO-RECTO | 65 | 12.80 |
| 3 | CUELLO DE UTERO | 29 | 5.71 |
| 4 | PULMON | 20 | 3.94 |
| 5 | TIROIDES | 20 | 3.94 |
| | PRIMARIO DESC. | 16 | 3.15 |



RIO NEGRO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| FRAY BENTOS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 48 | 18.75 |
| PIEL NO MELANOMA | 34 | 13.28 |
| COLO-RECTO | 30 | 11.72 |
| PULMON | 29 | 11.33 |
| ESTOMAGO | 19 | 7.42 |
| RIÑON | 11 | 4.30 |
| OTROS | 85 | 33.20 |
| TOTAL | 256 | |

| YOUNG | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 37 | 17.29 |
| PIEL NO MELANOMA | 33 | 15.42 |
| PULMON | 30 | 14.02 |
| COLO-RECTO | 21 | 9.81 |
| ESTOMAGO | 12 | 5.61 |
| PANCREAS | 12 | 5.61 |
| RIÑON | 8 | 3.74 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 8 | 3.74 |
| OTROS | 53 | 24.77 |
| TOTAL | 214 | |

| ALGORTA | | |
|--------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PANCREAS | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| PROSTATA | 1 | |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| GRECCO | | |
|----------------|-------|---|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| HUESO | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |

| SAN JAVIER | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 4 | 18.18 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 3 | 13.64 |
| PULMON | 3 | 13.64 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 13.64 |
| PRIMARIO DESC. | 2 | 9.09 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 2 | 9.09 |
| OTROS | 5 | 22.73 |
| TOTAL | 22 | |

| NUEVO BERLIN | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| RIÑON | 3 | 13.04 |
| ESTOMAGO | 2 | 8.70 |
| COLO-RECTO | 2 | 8.70 |
| PULMON | 2 | 8.70 |
| PROSTATA | 2 | 8.70 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 8.70 |
| OTROS | 10 | 43.48 |
| TOTAL | 23 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 3 | |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | |
| MELANOMA | 2 | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| LEUCEMIA | 1 | |
| TOTAL | 11 | |

MUJERES

| FRAY BENTOS | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 72 | 28.02 |
| PIEL NO MELANOMA | 34 | 13.23 |
| COLO-RECTO | 31 | 12.06 |
| PULMON | 13 | 5.06 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 13 | 5.06 |
| CUELLO DE UTERO | 11 | 4.28 |
| PRIMARIO DESC. | 11 | 4.28 |
| OTROS | 72 | 28.02 |
| TOTAL | 257 | |

| YOUNG | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 48 | 28.40 |
| COLO-RECTO | 22 | 13.02 |
| PIEL NO MELANOMA | 16 | 9.47 |
| CUELLO DE UTERO | 14 | 8.28 |
| ESTOMAGO | 7 | 4.14 |
| CUERPO DE UTERO | 7 | 4.14 |
| OTROS | 55 | 32.54 |
| TOTAL | 169 | |

| ALGORTA | | |
|----------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 1 | |
| RIÑON | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |

| GRECCO | | |
|------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| SAN JAVIER | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| RIÑON | 3 | 23.08 |
| COLO-RECTO | 2 | 15.38 |
| TIROIDES | 2 | 15.38 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 15.38 |
| OTROS | 4 | 30.77 |
| TOTAL | 13 | |

| NUEVO BERLIN | | |
|---------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 3 | |
| ESOFAGO | 1 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| PANCREAS | 1 | |
| PLEURA, MEDIASTINO, OTROS | 1 | |
| VAGINA | 1 | |
| CUERPO DE UTERO | 1 | |
| TOTAL | 9 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 26.67 |
| MAMA | 2 | 13.33 |
| CUERPO DE UTERO | 2 | 13.33 |
| OTROS | 7 | 46.67 |
| TOTAL | 15 | |

RIVERA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 4 | 21.99 | 1 | 5.58 |
| 5-9 | 4 | 20.55 | 2 | 11.29 |
| 10-14 | 1 | 3.87 | 0 | - |
| 15-19 | 2 | 7.80 | 7 | 28.94 |
| 20-24 | 6 | 34.46 | 6 | 34.45 |
| 25-29 | 6 | 37.39 | 16 | 99.51 |
| 30-34 | 5 | 30.32 | 18 | 100.01 |
| 35-39 | 16 | 115.20 | 38 | 242.05 |
| 40-44 | 19 | 133.80 | 32 | 188.28 |
| 45-49 | 34 | 201.08 | 70 | 405.91 |
| 50-54 | 76 | 473.67 | 89 | 531.12 |
| 55-59 | 101 | 799.81 | 91 | 676.78 |
| 60-64 | 156 | 1,476.15 | 84 | 700.23 |
| 65-69 | 159 | 1,880.54 | 105 | 1,026.79 |
| 70-74 | 184 | 2,506.47 | 105 | 1,213.03 |
| 75-79 | 146 | 2,717.29 | 108 | 1,360.89 |
| 80-84 | 93 | 3,106.21 | 113 | 1,968.64 |
| 85 y más | 70 | 3,449.98 | 108 | 2,132.70 |
| Sin edad | 8 | 8.00 | 2 | 2.00 |
| Total | 1090 | | 995 | |
| Tasa Aj. | | 321.54 | | 242.11 |
| Tasa Bruta | | 436.85 | | 375.82 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 252 | 23.12 |
| 2 PULMON | 144 | 13.21 |
| 3 COLO-RECTO | 93 | 8.53 |
| 4 ESTOMAGO | 55 | 5.05 |
| 5 VEJIGA | 51 | 4.68 |
| PRIMARIO DESC. | 48 | 4.40 |



| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 197 | 19.80 |
| 2 COLO-RECTO | 118 | 11.86 |
| 3 PULMON | 76 | 7.64 |
| 4 CUELLO DE UTERO | 65 | 6.53 |
| 5 PANCREAS | 47 | 4.72 |
| PRIMARIO DESC. | 38 | 3.82 |



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE RIVERA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 189 | 23.36 |
| PULMON | 109 | 13.47 |
| PIEL NO MELANOMA | 87 | 10.75 |
| COLO-RECTO | 68 | 8.41 |
| ESTOMAGO | 40 | 4.94 |
| VEJIGA | 38 | 4.70 |
| PRIMARIO DESC. | 34 | 4.20 |
| RIÑON | 30 | 3.71 |
| PANCREAS | 28 | 3.46 |
| OTROS | 186 | 22.99 |
| TOTAL | 809 | |

| TRANQUERAS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 13 | 22.03 |
| PULMON | 8 | 13.56 |
| PIEL NO MELANOMA | 6 | 10.17 |
| ESTOMAGO | 5 | 8.47 |
| RIÑON | 4 | 6.78 |
| PRIMARIO DESC. | 4 | 6.78 |
| OTROS | 19 | 32.20 |
| TOTAL | 59 | |

| MANDUBI | | |
|------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| RIÑON | 4 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| HUESO | 1 | |
| PROSTATA | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |
| TOTAL | 10 | |

| MINAS DE CORRALES | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 11 | 21.15 |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 15.38 |
| COLO-RECTO | 7 | 13.46 |
| PULMON | 5 | 9.62 |
| ESOFAGO | 4 | 7.69 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 3 | 5.77 |
| PRIMARIO DESC. | 3 | 5.77 |
| OTROS | 11 | 21.15 |
| TOTAL | 52 | |

| VICHADERO | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 15 | 30.61 |
| PULMON | 6 | 12.24 |
| COLO-RECTO | 5 | 10.20 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 10.20 |
| PANCREAS | 4 | 8.16 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 3 | 6.12 |
| PRIMARIO DESC. | 3 | 6.12 |
| OTROS | 8 | 16.33 |
| TOTAL | 49 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 7 | 16.28 |
| PULMON | 7 | 16.28 |
| PROSTATA | 7 | 16.28 |
| ESTOMAGO | 4 | 9.30 |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 9.30 |
| OTROS | 14 | 32.56 |
| TOTAL | 43 | |

MUJERES

| CIUDAD DE RIVERA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 166 | 20.22 |
| PIEL NO MELANOMA | 103 | 12.55 |
| COLO-RECTO | 95 | 11.57 |
| PULMON | 67 | 8.16 |
| CUELLO DE UTERO | 48 | 5.85 |
| PANCREAS | 36 | 4.38 |
| ESTOMAGO | 33 | 4.02 |
| OTROS | 273 | 33.25 |
| TOTAL | 821 | |

| TRANQUERAS | | |
|-----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 8 | 15.69 |
| COLO-RECTO | 7 | 13.73 |
| CUELLO DE UTERO | 5 | 9.80 |
| PANCREAS | 4 | 7.84 |
| PRIMARIO DESC. | 4 | 7.84 |
| OTROS | 23 | 45.10 |
| TOTAL | 51 | |

| MANDUBI | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 36.36 |
| PULMON | 2 | 18.18 |
| CUELLO DE UTERO | 2 | 18.18 |
| MAMA | 1 | 9.09 |
| VULVA | 1 | 9.09 |
| CUERPO DE UTERO | 1 | 9.09 |
| TOTAL | 11 | |


| MINAS DE CORRALES | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PANCREAS | 5 | 20.00 |
| MAMA | 5 | 20.00 |
| COLO-RECTO | 3 | 12.00 |
| OVARIO | 2 | 8.00 |
| PRIMARIO DESC. | 2 | 8.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 8.00 |
| OTROS | 6 | 24.00 |
| TOTAL | 25 | |

| VICHADERO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 6 | 21.43 |
| CUELLO DE UTERO | 6 | 21.43 |
| COLO-RECTO | 4 | 14.29 |
| OVARIO | 4 | 14.29 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 10.71 |
| OTROS | 5 | 17.86 |
| TOTAL | 28 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 4 | 26.67 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 20.00 |
| PULMON | 2 | 13.33 |
| MAMA | 2 | 13.33 |
| OTROS | 4 | 26.67 |
| TOTAL | 15 | |

ROCHA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 2 | 18.64 | 1 | 9.46 |
| 5-9 | 1 | 8.56 | 1 | 9.31 |
| 10-14 | 0 | - | 0 | - |
| 15-19 | 0 | - | 1 | 7.66 |
| 20-24 | 6 | 67.36 | 11 | 115.75 |
| 25-29 | 8 | 82.86 | 11 | 112.13 |
| 30-34 | 11 | 94.84 | 16 | 127.19 |
| 35-39 | 11 | 94.79 | 31 | 247.92 |
| 40-44 | 18 | 164.91 | 34 | 308.89 |
| 45-49 | 31 | 304.82 | 41 | 396.56 |
| 50-54 | 53 | 531.43 | 53 | 544.93 |
| 55-59 | 75 | 928.91 | 87 | 868.52 |
| 60-64 | 124 | 1,477.07 | 90 | 971.82 |
| 65-69 | 140 | 1,761.23 | 91 | 1,122.07 |
| 70-74 | 155 | 2,757.52 | 88 | 1,264.19 |
| 75-79 | 145 | 3,477.22 | 96 | 1,640.75 |
| 80-84 | 120 | 3,597.12 | 91 | 1,692.71 |
| 85 y más | 90 | 4,352.03 | 100 | 2,398.66 |
| Sin edad | 1 | 1.00 | 0 | - |
| Total | 991 | | 843 | |
| Tasa Aj. | | 359.99 | | 282.49 |
| Tasa Bruta | | 606.53 | | 487.03 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 188 | 18.97 |
| 2 PULMON | 146 | 14.73 |
| 3 COLO-RECTO | 118 | 11.91 |
| 4 VEJIGA | 56 | 5.65 |
| 5 ESTOMAGO | 36 | 3.63 |
| PRIMARIO DESC. | 34 | 3.43 |



| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 179 | 21.23 |
| 2 COLO-RECTO | 102 | 12.10 |
| 3 CUELLO DE UTERO | 46 | 5.46 |
| 4 PULMON | 43 | 5.10 |
| 5 PANCREAS | 32 | 3.80 |
| PRIMARIO DESC. | 28 | 3.32 |



ROCHA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE ROCHA | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 72 | 20.11 |
| PULMON | 54 | 15.08 |
| PIEL NO MELANOMA | 51 | 14.25 |
| COLO-RECTO | 37 | 10.34 |
| PRIMARIO DESC. | 18 | 5.03 |
| VEJIGA | 17 | 4.75 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 11 | 3.07 |
| ESTOMAGO | 10 | 2.79 |
| RIÑON | 10 | 2.79 |
| OTROS | 78 | 21.79 |
| TOTAL | 358 | |

| CASTILLOS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 27 | 25.47 |
| PIEL NO MELANOMA | 18 | 16.98 |
| PULMON | 13 | 12.26 |
| COLO-RECTO | 11 | 10.38 |
| OTROS | 37 | 34.91 |
| TOTAL | 106 | |

| LASCANO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 20 | 21.05 |
| PIEL NO MELANOMA | 15 | 15.79 |
| COLO-RECTO | 13 | 13.68 |
| PULMON | 13 | 13.68 |
| VEJIGA | 8 | 8.42 |
| OTROS | 26 | 27.37 |
| TOTAL | 95 | |

| SAN LUIS AL MEDIO | | |
|-------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 4 | |
| PULMON | 2 | |
| ESTOMAGO | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| RIÑON | 1 | |
| TOTAL | 9 | |

| LA PALOMA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 14 | 21.21 |
| PIEL NO MELANOMA | 14 | 21.21 |
| PROSTATA | 9 | 13.64 |
| PULMON | 8 | 12.12 |
| ESOFAGO | 3 | 4.55 |
| ESTOMAGO | 3 | 4.55 |
| VEJIGA | 3 | 4.55 |
| OTROS | 12 | 18.18 |
| TOTAL | 66 | |

| CHUY | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 33 | 19.30 |
| PULMON | 27 | 15.79 |
| PIEL NO MELANOMA | 22 | 12.87 |
| COLO-RECTO | 19 | 11.11 |
| VEJIGA | 13 | 7.60 |
| OTROS | 57 | 33.33 |
| TOTAL | 171 | |

| LA CORONILLA | | |
|--------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 6 | 35.29 |
| COLO-RECTO | 2 | 11.76 |
| OTROS | 9 | 52.94 |
| TOTAL | 17 | |

| VELAZQUEZ | | |
|------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 3 | |
| COLO-RECTO | 2 | |
| OTROS | 5 | |
| TOTAL | 10 | |

| CEBOLLATI | | |
|-----------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 3 | 21.43 |
| PULMON | 2 | 14.29 |
| LEUCEMIA | 2 | 14.29 |
| OTROS | 7 | 50.00 |
| TOTAL | 14 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PULMON | 3 | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| HIGADO | 1 | |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |
| VEJIGA | 1 | |

MUJERES

| CIUDAD DE ROCHA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 62 | 20.20 |
| PIEL NO MELANOMA | 54 | 17.59 |
| COLO-RECTO | 39 | 12.70 |
| CUELLO DE UTERO | 16 | 5.21 |
| PULMON | 14 | 4.56 |
| PANCREAS | 12 | 3.91 |
| TIROIDES | 11 | 3.58 |
| LEUCEMIA | 11 | 3.58 |
| OTROS | 88 | 28.66 |
| TOTAL | 307 | |

| CASTILLOS | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 19 | 22.89 |
| MAMA | 16 | 19.28 |
| COLO-RECTO | 12 | 14.46 |
| PANCREAS | 6 | 7.23 |
| CUELLO DE UTERO | 4 | 4.82 |
| VEJIGA | 4 | 4.82 |
| TIROIDES | 4 | 4.82 |
| OTROS | 18 | 21.69 |
| TOTAL | 83 | |

| LASCANO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 22 | 21.36 |
| PIEL NO MELANOMA | 17 | 16.50 |
| COLO-RECTO | 16 | 15.53 |
| PRIMARIO DESC. | 9 | 8.74 |
| OTROS | 39 | 37.86 |
| TOTAL | 103 | |

| CHUY | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 31 | 21.83 |
| COLO-RECTO | 17 | 11.97 |
| PIEL NO MELANOMA | 16 | 11.27 |
| PULMON | 12 | 8.45 |
| CUELLO DE UTERO | 12 | 8.45 |
| OTROS | 54 | 38.03 |
| TOTAL | 142 | |

| VELAZQUEZ | | |
|---------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 3 | 33.33 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 22.22 |
| PANCREAS | 1 | 11.11 |
| PLEURA, MEDIASTINO, OTROS | 1 | 11.11 |
| CUELLO DE UTERO | 1 | 11.11 |
| UTERO S/E | 1 | 11.11 |
| TOTAL | 9 | |

| SAN LUIS AL MEDIO | | |
|-------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| MAMA | 4 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| VULVA | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| CEBOLLATI | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 2 | 16.67 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 16.67 |
| OTROS | 8 | 66.67 |
| TOTAL | 12 | |


| LA PALOMA | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 10 | 34.48 |
| PIEL NO MELANOMA | 6 | 20.69 |
| COLO-RECTO | 3 | 10.34 |
| PULMON | 3 | 10.34 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 2 | 6.90 |
| OTROS | 5 | 17.24 |
| TOTAL | 29 | |

| LA CORONILLA | | |
|----------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 3 | |
| MAMA | 2 | |
| PRIMARIO DESC. | 2 | |
| OTROS GENITALES FEM. | 1 | |
| TOTAL | 8 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| ESTOMAGO | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |
| LINFOMA DE HODGKIN | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |
| TOTAL | 6 | |

SALTO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 4 | 16.55 | 5 | 22.29 |
| 5-9 | 1 | 4.03 | 3 | 13.44 |
| 10-14 | 7 | 22.43 | 6 | 20.58 |
| 15-19 | 3 | 10.00 | 7 | 22.77 |
| 20-24 | 9 | 36.88 | 9 | 36.76 |
| 25-29 | 12 | 56.08 | 16 | 72.92 |
| 30-34 | 11 | 54.54 | 26 | 122.61 |
| 35-39 | 11 | 55.59 | 40 | 188.91 |
| 40-44 | 27 | 165.25 | 69 | 395.37 |
| 45-49 | 39 | 231.89 | 86 | 474.90 |
| 50-54 | 75 | 481.26 | 93 | 530.10 |
| 55-59 | 97 | 640.81 | 119 | 711.89 |
| 60-64 | 155 | 1,149.17 | 128 | 872.59 |
| 65-69 | 215 | 1,867.29 | 131 | 1,049.60 |
| 70-74 | 238 | 2,775.19 | 140 | 1,358.56 |
| 75-79 | 181 | 2,622.43 | 139 | 1,540.34 |
| 80-84 | 159 | 3,941.50 | 140 | 2,184.43 |
| 85 y más | 91 | 4,073.41 | 126 | 2,381.40 |
| Sin edad | 0 | | 1 | 1.00 |
| Total | 1335 | | 1284 | |
| Tasa Aj. | | 316.66 | | 274.38 |
| Tasa Bruta | | 435.45 | | 399.43 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 265 | 19.85 |
| 2 | COLO-RECTO | 138 | 10.34 |
| 3 | PULMON | 112 | 8.39 |
| 4 | ESTOMAGO | 84 | 6.29 |
| 5 | RIÑON | 77 | 5.77 |
| | PRIMARIO DESC. | 38 | 2.85 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 261 | 20.33 |
| 2 | COLO-RECTO | 173 | 13.47 |
| 3 | CUELLO DE UTERO | 87 | 6.78 |
| 4 | TIROIDES | 66 | 5.14 |
| 5 | PANCREAS | 40 | 3.12 |
| | PRIMARIO DESC. | 51 | 3.97 |



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE SALTO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 235 | 19.57 |
| PIEL NO MELANOMA | 235 | 19.57 |
| COLO-RECTO | 123 | 10.24 |
| PULMON | 102 | 8.49 |
| ESTOMAGO | 73 | 6.08 |
| RIÑON | 66 | 5.50 |
| PRIMARIO DESC. | 37 | 3.08 |
| VEJIGA | 35 | 2.91 |
| OTROS | 295 | 24.56 |
| TOTAL | 1201 | |

| CONSTITUCION | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 7 | 28.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 16.00 |
| PULMON | 3 | 12.00 |
| ESTOMAGO | 2 | 8.00 |
| COLO-RECTO | 2 | 8.00 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 2 | 8.00 |
| OTROS | 5 | 20.00 |
| TOTAL | 25 | |

| MIGLIARO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 4 | 28.57 |
| PROSTATA | 3 | 21.43 |
| ESTOMAGO | 2 | 14.29 |
| PULMON | 2 | 14.29 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 14.29 |
| TESTICULO | 1 | 7.14 |
| TOTAL | 14 | |

| SAN ANTONIO | | |
|------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 3 | |
| ESTOMAGO | 2 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| BELEN | | |
|----------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 4 | 26.67 |
| ESTOMAGO | 2 | 13.33 |
| OTROS | 9 | 60.00 |
| TOTAL | 15 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 8 | 28.57 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 17.86 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 3 | 10.71 |
| COLO-RECTO | 3 | 10.71 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 3 | 10.71 |
| OTROS | 6 | 21.43 |
| TOTAL | 28 | |

MUJERES

| CIUDAD DE SALTO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 239 | 20.55 |
| PIEL NO MELANOMA | 186 | 15.99 |
| COLO-RECTO | 158 | 13.59 |
| CUELLO DE UTERO | 71 | 6.10 |
| TIROIDES | 61 | 5.25 |
| PRIMARIO DESC. | 49 | 4.21 |
| PANCREAS | 36 | 3.10 |
| OTROS | 363 | 31.21 |
| TOTAL | 1163 | |

| CONSTITUCION | | |
|-----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 6 | 28.57 |
| CUELLO DE UTERO | 4 | 19.05 |
| COLO-RECTO | 2 | 9.52 |
| RIÑON | 2 | 9.52 |
| OTROS | 7 | 33.33 |
| TOTAL | 21 | |

| BELEN | | |
|----------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| CUELLO DE UTERO | 3 | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| COLO-RECTO | 1 | |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |
| PANCREAS | 1 | |
| OVARIO | 1 | |
| TIROIDES | 1 | |
| OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS | 1 | |
| LEUCEMIA | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |
| TOTAL | 12 | |


| SAN ANTONIO | | |
|--------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| CUELLO DE UTERO | 1 | |
| LINFOMA DE HODGKIN | 1 | |

| MIGLIARO | | |
|----------------|-------|---|
| | Casos | % |
| ESTOMAGO | 2 | |
| RIÑON | 2 | |
| PANCREAS | 1 | |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |
| TOTAL | 6 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 6 | 20.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 16.67 |
| COLO-RECTO | 4 | 13.33 |
| ESTOMAGO | 3 | 10.00 |
| OTROS | 12 | 40.00 |
| TOTAL | 30 | |

SAN JOSE


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 4 | 21.29 | 4 | 22.00 |
| 5-9 | 1 | 4.99 | 0 | - |
| 10-14 | 5 | 23.21 | 0 | - |
| 15-19 | 5 | 21.81 | 3 | 13.85 |
| 20-24 | 3 | 14.86 | 7 | 38.61 |
| 25-29 | 8 | 41.79 | 13 | 75.12 |
| 30-34 | 9 | 41.66 | 22 | 105.89 |
| 35-39 | 18 | 78.13 | 50 | 243.16 |
| 40-44 | 35 | 223.29 | 41 | 267.82 |
| 45-49 | 44 | 271.87 | 56 | 336.88 |
| 50-54 | 67 | 423.35 | 78 | 493.80 |
| 55-59 | 140 | 913.66 | 107 | 673.13 |
| 60-64 | 170 | 1,277.81 | 128 | 927.81 |
| 65-69 | 244 | 2,315.87 | 130 | 1,179.14 |
| 70-74 | 221 | 2,739.90 | 138 | 1,343.46 |
| 75-79 | 195 | 3,097.21 | 150 | 1,658.74 |
| 80-84 | 145 | 3,607.86 | 107 | 1,594.64 |
| 85 y más | 86 | 3,159.44 | 106 | 1,923.43 |
| Sin edad | 0 | - | 0 | - |
| Total | 1400 | | 1140 | |
| Tasa Aj. | | 346.44 | | 255.36 |
| Tasa Bruta | | 508.69 | | 410.89 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 228 | 16.29 |
| 2 | PULMON | 206 | 14.71 |
| 3 | COLO-RECTO | 144 | 10.29 |
| 4 | VEJIGA | 90 | 6.43 |
| 5 | RIÑON | 76 | 5.43 |
| | PRIMARIO DESC. | 40 | 2.86 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 252 | 22.11 |
| 2 | COLO-RECTO | 130 | 11.40 |
| 3 | PULMON | 61 | 5.35 |
| 4 | CUELLO DE UTERO | 61 | 5.35 |
| 5 | CUERPO DE UTERO | 47 | 4.12 |
| | PRIMARIO DESC. | 30 | 2.63 |



SAN JOSE

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| SAN JOSE DE MAYO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 90 | 15.57 |
| PIEL NO MELANOMA | 84 | 14.53 |
| PULMON | 81 | 14.01 |
| COLO-RECTO | 54 | 9.34 |
| VEJIGA | 39 | 6.75 |
| RIÑON | 33 | 5.71 |
| PANCREAS | 23 | 3.98 |
| PRIMARIO DESC. | 19 | 3.29 |
| OTROS | 155 | 26.82 |
| TOTAL | 578 | |

| ECILDA PAULLIER | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 12 | 21.43 |
| PIEL NO MELANOMA | 12 | 21.43 |
| PULMON | 9 | 16.07 |
| COLO-RECTO | 8 | 14.29 |
| OTROS | 15 | 26.79 |
| TOTAL | 56 | |

| VILLA RODRIGUEZ | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 15 | 20.83 |
| PROSTATA | 12 | 16.67 |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 11.11 |
| COLO-RECTO | 7 | 9.72 |
| RIÑON | 7 | 9.72 |
| OTRAS | 23 | 31.94 |
| TOTAL | 72 | |

MUJERES

| SAN JOSE DE MAYO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 115 | 21.78 |
| PIEL NO MELANOMA | 81 | 15.34 |
| COLO-RECTO | 54 | 10.23 |
| CUELLO DE UTERO | 34 | 6.44 |
| OVARIO | 27 | 5.11 |
| PULMON | 24 | 4.55 |
| PANCREAS | 23 | 4.36 |
| CUERPO DE UTERO | 23 | 4.36 |
| OTROS | 147 | 27.84 |
| TOTAL | 528 | |

| RAFAEL PERAZZA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 3 | 15.79 |
| COLO-RECTO | 2 | 10.53 |
| OVARIO | 2 | 10.53 |
| LEUCEMIA | 2 | 10.53 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 10.53 |
| OTROS | 8 | 42.11 |
| TOTAL | 19 | |

| VILLA RODRIGUEZ | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 10 | 19.61 |
| MAMA | 9 | 17.65 |
| COLO-RECTO | 7 | 13.73 |
| OVARIO | 4 | 7.84 |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 3 | 5.88 |
| RIÑON | 3 | 5.88 |
| OTROS | 15 | 29.41 |
| TOTAL | 51 | |

| ITUZAINGO | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 5 | 33.33 |
| COLO-RECTO | 2 | 13.33 |
| RIÑON | 2 | 13.33 |
| OTRAS | 6 | 40.00 |
| TOTAL | 15 | |

| LIBERTAD | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 34 | 20.48 |
| PROSTATA | 28 | 16.87 |
| PULMON | 21 | 12.65 |
| COLO-RECTO | 16 | 9.64 |
| PANCREAS | 11 | 6.63 |
| VEJIGA | 10 | 6.02 |
| RIÑON | 8 | 4.82 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 7 | 4.22 |
| ESTOMAGO | 4 | 2.41 |
| OTROS | 27 | 16.27 |
| TOTAL | 166 | |

| RAFAEL PERAZZA | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 5 | 23.81 |
| PROSTATA | 5 | 23.81 |
| COLO-RECTO | 2 | 9.52 |
| VEJIGA | 2 | 9.52 |
| OTRAS | 7 | 33.33 |
| TOTAL | 21 | |

| ITUZAINGO | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 3 | 20.00 |
| MAMA | 2 | 13.33 |
| CUELLO DE UTERO | 2 | 13.33 |
| LINFOMA DE HODGKIN | 2 | 13.33 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 13.33 |
| OTROS | 4 | 26.67 |
| TOTAL | 15 | |

| LIBERTAD | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 32 | 25.60 |
| PIEL NO MELANOMA | 26 | 20.80 |
| COLO-RECTO | 13 | 10.40 |
| CUELLO DE UTERO | 9 | 7.20 |
| RIÑON | 5 | 4.00 |
| OTROS | 40 | 32.00 |
| TOTAL | 125 | |

| ECILDA PAULLIER | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 14 | 30.43 |
| CUERPO DE UTERO | 6 | 13.04 |
| MAMA | 5 | 10.87 |
| COLO-RECTO | 4 | 8.70 |
| PULMON | 4 | 8.70 |
| TIROIDES | 3 | 6.52 |
| OTROS | 10 | 21.74 |
| TOTAL | 46 | |

| PUNTAS DE VALDEZ | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 6 | 20.69 |
| PULMON | 5 | 17.24 |
| PROSTATA | 4 | 13.79 |
| COLO-RECTO | 3 | 10.34 |
| VEJIGA | 2 | 6.90 |
| OTROS | 9 | 31.03 |
| TOTAL | 29 | |

| CIUDAD DEL PLATA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 36 | 14.23 |
| COLO-RECTO | 35 | 13.83 |
| PULMON | 33 | 13.04 |
| PIEL NO MELANOMA | 22 | 8.70 |
| VEJIGA | 13 | 5.14 |
| ESTOMAGO | 12 | 4.74 |
| PANCREAS | 12 | 4.74 |
| RIÑON | 12 | 4.74 |
| PRIMARIO DESC. | 12 | 4.74 |
| OTROS | 66 | 26.09 |
| TOTAL | 253 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 13 | 20.31 |
| PROSTATA | 12 | 18.75 |
| PULMON | 8 | 12.50 |
| VEJIGA | 5 | 7.81 |
| COLO-RECTO | 4 | 6.25 |
| RIÑON | 4 | 6.25 |
| OTROS | 18 | 28.13 |
| TOTAL | 64 | |


| PUNTAS DE VALDEZ | | |
|----------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 3 | 25.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 25.00 |
| CUERPO DE UTERO | 1 | 8.33 |
| OTROS GENITALES FEM. | 1 | 8.33 |
| RIÑON | 1 | 8.33 |
| VEJIGA | 1 | 8.33 |
| TIROIDES | 1 | 8.33 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | 8.33 |
| TOTAL | 12 | |

| CIUDAD DEL PLATA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 56 | 25.23 |
| COLO-RECTO | 24 | 10.81 |
| PIEL NO MELANOMA | 21 | 9.46 |
| PULMON | 16 | 7.21 |
| CUERPO DE UTERO | 12 | 5.41 |
| CUELLO DE UTERO | 11 | 4.95 |
| PRIMARIO DESC. | 11 | 4.95 |
| TIROIDES | 9 | 4.05 |
| OTROS | 62 | 27.93 |
| TOTAL | 222 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 9 | 39.13 |
| COLO-RECTO | 5 | 21.74 |
| PULMON | 2 | 8.70 |
| OTROS | 7 | 30.43 |
| TOTAL | 23 | |

SORIANO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el período | Tasa Esp. | Nº casos en el período | Tasa Esp. |
| 0-4 | 2 | 14.74 | 1 | 8.13 |
| 5-9 | 2 | 12.97 | 2 | 13.02 |
| 10-14 | 3 | 16.32 | 2 | 11.23 |
| 15-19 | 3 | 16.86 | 3 | 18.40 |
| 20-24 | 6 | 50.11 | 3 | 26.97 |
| 25-29 | 8 | 60.68 | 7 | 51.17 |
| 30-34 | 3 | 19.31 | 18 | 117.98 |
| 35-39 | 12 | 88.88 | 30 | 226.77 |
| 40-44 | 14 | 122.24 | 39 | 343.92 |
| 45-49 | 23 | 203.05 | 63 | 535.76 |
| 50-54 | 54 | 452.60 | 62 | 505.87 |
| 55-59 | 88 | 780.63 | 72 | 597.61 |
| 60-64 | 132 | 1,215.25 | 103 | 931.62 |
| 65-69 | 177 | 2,160.12 | 106 | 1,288.75 |
| 70-74 | 181 | 2,934.03 | 94 | 1,297.27 |
| 75-79 | 144 | 2,641.23 | 106 | 1,507.18 |
| 80-84 | 121 | 3,332.42 | 101 | 1,812.96 |
| 85 y más | 91 | 3,966.87 | 92 | 1,767.19 |
| Sin edad | 0 | - | 0 | - |
| Total | 1064 | | 904 | |
| Tasa Aj. | | 329.78 | | 268.70 |
| Tasa Bruta | | 526.88 | | 437.13 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 203 | 19.08 |
| 2 PULMON | 140 | 13.16 |
| 3 COLO-RECTO | 139 | 13.06 |
| 4 VEJIGA | 69 | 6.48 |
| 5 RIÑON | 57 | 5.36 |
| PRIMARIO DESC. | 32 | 3.01 |



| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 199 | 22.01 |
| 2 COLO-RECTO | 119 | 13.16 |
| 3 CUELLO DE UTERO | 41 | 4.54 |
| 4 RIÑON | 40 | 4.42 |
| 5 TIROIDES | 33 | 3.65 |
| PRIMARIO DESC. | 30 | 3.32 |



SORIANO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| MERCEDES | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 128 | 19.81 |
| PIEL NO MELANOMA | 101 | 15.63 |
| COLO-RECTO | 76 | 11.76 |
| PULMON | 75 | 11.61 |
| VEJIGA | 48 | 7.43 |
| RIÑON | 38 | 5.88 |
| ESTOMAGO | 28 | 4.33 |
| PRIMARIO DESC. | 16 | 2.48 |
| OTROS | 136 | 21.05 |
| TOTAL | 646 | |

| CARDONA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 27 | 22.69 |
| PROSTATA | 17 | 14.29 |
| PULMON | 16 | 13.45 |
| PIEL NO MELANOMA | 16 | 13.45 |
| ESTOMAGO | 7 | 5.88 |
| PRIMARIO DESC. | 6 | 5.04 |
| OTROS | 30 | 25.21 |
| TOTAL | 119 | |

| VILLA SORIANO | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 3 | 27.27 |
| ESTOMAGO | 2 | 18.18 |
| PROSTATA | 2 | 18.18 |
| VEJIGA | 2 | 18.18 |
| COLO-RECTO | 1 | 9.09 |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | 9.09 |
| TOTAL | 11 | |

| JOSE ENRIQUE RODO | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 4 | 36.36 |
| PROSTATA | 4 | 36.36 |
| ESTOMAGO | 1 | 9.09 |
| COLO-RECTO | 1 | 9.09 |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | 9.09 |
| TOTAL | 11 | |

| PALMITAS | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 6 | 42.86 |
| PULMON | 4 | 28.57 |
| COLO-RECTO | 3 | 21.43 |
| RIÑON | 1 | 7.14 |
| TOTAL | 14 | |

| DOLORES | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 37 | 16.74 |
| PIEL NO MELANOMA | 36 | 16.29 |
| PULMON | 34 | 15.38 |
| COLO-RECTO | 26 | 11.76 |
| ESTOMAGO | 15 | 6.79 |
| RIÑON | 14 | 6.33 |
| VEJIGA | 14 | 6.33 |
| OTROS | 45 | 20.36 |
| TOTAL | 221 | |

| SANTA CATALINA | | |
|----------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 2 | 22.22 |
| PRIMARIO DESC. | 2 | 22.22 |
| OTROS | 5 | 55.56 |
| TOTAL | 9 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 1 | |
| PROSTATA | 1 | |
| OTROS | 1 | |

MUJERES

| MERCEDES | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 110 | 20.11 |
| PIEL NO MELANOMA | 89 | 16.27 |
| COLO-RECTO | 67 | 12.25 |
| CUELLO DE UTERO | 27 | 4.94 |
| RIÑON | 27 | 4.94 |
| TIROIDES | 24 | 4.39 |
| PULMON | 20 | 3.66 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 20 | 3.66 |
| OTROS | 163 | 29.80 |
| TOTAL | 547 | |

| CARDONA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 30 | 26.79 |
| PIEL NO MELANOMA | 21 | 18.75 |
| COLO-RECTO | 17 | 15.18 |
| TIROIDES | 6 | 5.36 |
| PULMON | 5 | 4.46 |
| OTROS | 33 | 29.46 |
| TOTAL | 112 | |

| SANTA CATALINA | | |
|----------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PRIMARIO DESC. | 1 | |

| DOLORES | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 50 | 24.63 |
| COLO-RECTO | 30 | 14.78 |
| PIEL NO MELANOMA | 24 | 11.82 |
| PRIMARIO DESC. | 12 | 5.91 |
| ESTOMAGO | 10 | 4.93 |
| PANCREAS | 10 | 4.93 |
| OTROS | 67 | 33.00 |
| TOTAL | 203 | |

| JOSE ENRIQUE RODO | | |
|----------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 6 | 46.15 |
| COLO-RECTO | 1 | 7.69 |
| MELANOMA | 1 | 7.69 |
| CUELLO DE UTERO | 1 | 7.69 |
| RIÑON | 1 | 7.69 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | 7.69 |
| OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS | 1 | 7.69 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | 7.69 |
| TOTAL | 13 | |


| VILLA SORIANO | | |
|-------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| INTESTINO DELGADO | 1 | |

| PALMITAS | | |
|---------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 2 | |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| SARCOMA DE PARTES BLANDAS | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| TOTAL | 5 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

TACUAREMBO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 3 | 21.26 | 3 | 21.57 |
| 5-9 | 5 | 28.79 | 1 | 6.29 |
| 10-14 | 0 | - | 1 | 4.78 |
| 15-19 | 0 | - | 8 | 39.30 |
| 20-24 | 8 | 58.88 | 4 | 30.80 |
| 25-29 | 7 | 53.81 | 11 | 81.31 |
| 30-34 | 14 | 99.12 | 13 | 79.31 |
| 35-39 | 11 | 75.59 | 25 | 173.42 |
| 40-44 | 18 | 135.64 | 40 | 266.26 |
| 45-49 | 30 | 205.68 | 68 | 436.07 |
| 50-54 | 58 | 430.59 | 65 | 464.82 |
| 55-59 | 85 | 749.49 | 93 | 758.13 |
| 60-64 | 143 | 1,411.79 | 90 | 814.26 |
| 65-69 | 171 | 1,899.79 | 86 | 918.41 |
| 70-74 | 166 | 2,399.19 | 110 | 1,372.94 |
| 75-79 | 175 | 3,229.38 | 107 | 1,504.50 |
| 80-84 | 115 | 3,398.35 | 87 | 1,707.89 |
| 85 y más | 87 | 4,211.04 | 88 | 1,890.44 |
| Sin edad | 0 | - | 0 | - |
| Total | 1096 | | 900 | |
| Tasa Aj. | | 328.71 | | 247.64 |
| Tasa Bruta | | 500.98 | | 390.38 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | | Casos | % |
|---------|----------------|-------|-------|
| 1 | PROSTATA | 213 | 19.43 |
| 2 | PULMON | 174 | 15.88 |
| 3 | COLO-RECTO | 122 | 11.13 |
| 4 | ESTOMAGO | 63 | 5.75 |
| 5 | PANCREAS | 46 | 4.20 |
| | PRIMARIO DESC. | 19 | 1.73 |



| Mujeres | | Casos | % |
|---------|-----------------|-------|-------|
| 1 | MAMA | 192 | 21.33 |
| 2 | COLO-RECTO | 123 | 13.67 |
| 3 | PANCREAS | 53 | 5.89 |
| 4 | PULMON | 48 | 5.33 |
| 5 | CUELLO DE UTERO | 45 | 5.00 |
| | PRIMARIO DESC. | 12 | 1.33 |



TACUAREMBO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE TACUAREMBO | | |
|----------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 132 | 18.33 |
| PIEL NO MELANOMA | 100 | 13.89 |
| PULMON | 99 | 13.75 |
| COLO-RECTO | 78 | 10.83 |
| ESTOMAGO | 45 | 6.25 |
| PANCREAS | 33 | 4.58 |
| VEJIGA | 32 | 4.44 |
| OTROS | 201 | 27.92 |
| TOTAL | 720 | |

| PASO DE LOS TOROS | | |
|-------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 22 | 19.64 |
| PULMON | 19 | 16.96 |
| COLO-RECTO | 17 | 15.18 |
| PIEL NO MELANOMA | 8 | 7.14 |
| RIÑON | 7 | 6.25 |
| LEUCEMIA | 5 | 4.46 |
| OTROS | 34 | 30.36 |
| TOTAL | 112 | |

| SAN GREGORIO DE POLANCO | | |
|-------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 13 | 27.66 |
| PULMON | 11 | 23.40 |
| COLO-RECTO | 6 | 12.77 |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 8.51 |
| RIÑON | 2 | 4.26 |
| VEJIGA | 2 | 4.26 |
| OTROS | 9 | 19.15 |
| TOTAL | 47 | |

| ACHAR | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 20.00 |
| ESTOMAGO | 1 | 10.00 |
| COLO-RECTO | 1 | 10.00 |
| PANCREAS | 1 | 10.00 |
| PULMON | 1 | 10.00 |
| TESTICULO | 1 | 10.00 |
| RIÑON | 1 | 10.00 |
| VEJIGA | 1 | 10.00 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 1 | 10.00 |
| TOTAL | 10 | |

| TAMBORES | | |
|------------------|-------|--------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 4 | 17.39 |
| COLO-RECTO | 4 | 17.39 |
| ESTOMAGO | 4 | 17.39 |
| RIÑON | 4 | 17.39 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 13.04 |
| OTROS | 4 | 17.391 |
| TOTAL | 23 | |

| CURTINA | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 3 | 20.00 |
| PROSTATA | 3 | 20.00 |
| PULMON | 2 | 13.33 |
| OTROS | 7 | 46.67 |
| TOTAL | 15 | |

| LAS TOSCAS | | |
|------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 6 | 33.33 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 3 | 16.67 |
| COLO-RECTO | 2 | 11.11 |
| VEJIGA | 2 | 11.11 |
| OTROS | 5 | 27.78 |
| TOTAL | 18 | |

| ANSINA | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 7 | 25.93 |
| PULMON | 4 | 14.81 |
| COLO-RECTO | 3 | 11.11 |
| OTROS | 13 | 48.15 |
| TOTAL | 27 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 16 | 22.86 |
| PULMON | 15 | 21.43 |
| COLO-RECTO | 8 | 11.43 |
| PIEL NO MELANOMA | 7 | 10.00 |
| ESTOMAGO | 5 | 7.14 |
| PANCREAS | 4 | 5.71 |
| OTROS | 15 | 21.43 |
| TOTAL | 70 | |

MUJERES

| CIUDAD DE TACUAREMBO | | |
|----------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 129 | 21.72 |
| COLO-RECTO | 79 | 13.30 |
| PIEL NO MELANOMA | 71 | 11.95 |
| PANCREAS | 32 | 5.39 |
| TIROIDES | 31 | 5.22 |
| PULMON | 30 | 5.05 |
| OTROS | 222 | 37.37 |
| TOTAL | 594 | |

| PASO DE LOS TOROS | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 25 | 23.58 |
| COLO-RECTO | 15 | 14.15 |
| PANCREAS | 8 | 7.55 |
| ESTOMAGO | 7 | 6.60 |
| PULMON | 7 | 6.60 |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 6 | 5.66 |
| OTROS | 38 | 35.85 |
| TOTAL | 106 | |

| SAN GREGORIO DE POLANCO | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 6 | 19.35 |
| MAMA | 6 | 19.35 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 16.13 |
| CUELLO DE UTERO | 3 | 9.68 |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 2 | 6.45 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 2 | 6.45 |
| OTROS | 7 | 22.58 |
| TOTAL | 31 | |

| ACHAR | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| ESTOMAGO | 2 | 16.67 |
| COLO-RECTO | 2 | 16.67 |
| MAMA | 2 | 16.67 |
| OVARIO | 2 | 16.67 |
| OTROS | 4 | 33.33 |
| TOTAL | 12 | |

| CURTINA | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 3 | 27.27 |
| ESOFAGO | 2 | 18.18 |
| COLO-RECTO | 2 | 18.18 |
| PANCREAS | 2 | 18.18 |
| VEJIGA | 1 | 9.09 |
| OJO | 1 | 9.09 |
| TOTAL | 11 | |

| ANSINA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 7 | 31.82 |
| MAMA | 5 | 22.73 |
| CUELLO DE UTERO | 4 | 18.18 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 9.09 |
| OTROS | 4 | 18.18 |
| TOTAL | 22 | |


| LAS TOCAS | | |
|--------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 3 | 15.00 |
| MAMA | 3 | 15.00 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 3 | 15.00 |
| PANCREAS | 2 | 10.00 |
| CUELLO DE UTERO | 2 | 10.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 10.00 |
| OTROS | 5 | 25.00 |
| TOTAL | 20 | |

| TAMBORES | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 2 | 28.57 |
| MAMA | 2 | 28.57 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 28.57 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | 14.29 |
| TOTAL | 7 | |

| ZONA RURAL | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 13 | 26.00 |
| COLO-RECTO | 6 | 12.00 |
| CUELLO DE UTERO | 5 | 10.00 |
| PIEL NO MELANOMA | 5 | 10.00 |
| VESICULA Y VIAS BILIARES | 3 | 6.00 |
| PANCREAS | 3 | 6.00 |
| PULMON | 3 | 6.00 |
| OTROS | 12 | 24.00 |
| TOTAL | 50 | |

TREINTA Y TRES


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2012 - 2016




| Edades | Hombres | | Mujeres | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. | Nº casos en el periodo | Tasa Esp. |
| 0-4 | 1 | 13.03 | 0 | - |
| 5-9 | 0 | - | 0 | - |
| 10-14 | 1 | 9.39 | 1 | 9.58 |
| 15-19 | 1 | 8.57 | 3 | 26.70 |
| 20-24 | 5 | 70.93 | 1 | 14.36 |
| 25-29 | 7 | 114.40 | 5 | 67.66 |
| 30-34 | 1 | 12.64 | 7 | 82.59 |
| 35-39 | 5 | 64.93 | 15 | 184.41 |
| 40-44 | 9 | 130.45 | 26 | 322.02 |
| 45-49 | 16 | 195.38 | 32 | 415.05 |
| 50-54 | 32 | 486.99 | 30 | 426.26 |
| 55-59 | 47 | 722.74 | 39 | 617.68 |
| 60-64 | 60 | 1,166.18 | 43 | 652.70 |
| 65-69 | 86 | 1,680.34 | 55 | 938.25 |
| 70-74 | 103 | 2,490.33 | 61 | 1,341.84 |
| 75-79 | 93 | 3,233.66 | 55 | 1,412.43 |
| 80-84 | 70 | 4,098.36 | 59 | 2,193.31 |
| 85 y más | 48 | 3,883.50 | 70 | 2,500.89 |
| Sin edad | 0 | - | 0 | - |
| Total | 585 | | 502 | |
| Tasa Aj. | | 314.58 | | 234.78 |
| Tasa Bruta | | 507.71 | | 408.43 |

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2012 - 2016

| Hombres | Casos | % |
|----------------|-------|-------|
| 1 PROSTATA | 108 | 18.46 |
| 2 PULMON | 94 | 16.07 |
| 3 COLO-RECTO | 55 | 9.40 |
| 4 RIÑON | 28 | 4.79 |
| 5 VEJIGA | 26 | 4.44 |
| PRIMARIO DESC. | 24 | 4.10 |



| Mujeres | Casos | % |
|-------------------|-------|-------|
| 1 MAMA | 110 | 21.91 |
| 2 COLO-RECTO | 68 | 13.55 |
| 3 PULMON | 33 | 6.57 |
| 4 PANCREAS | 22 | 4.38 |
| 5 CUELLO DE UTERO | 20 | 3.98 |
| PRIMARIO DESC. | 19 | 3.78 |



TREINTA Y TRES

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2012 - 2016

HOMBRES

| CIUDAD DE TREINTA Y TRES | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 78 | 18.75 |
| PULMON | 66 | 15.87 |
| PIEL NO MELANOMA | 60 | 14.42 |
| COLO-RECTO | 38 | 9.13 |
| RIÑON | 19 | 4.57 |
| PRIMARIO DESC. | 16 | 3.85 |
| ESTOMAGO | 15 | 3.61 |
| VEJIGA | 15 | 3.61 |
| OTROS | 109 | 26.20 |
| TOTAL | 416 | |

| SANTA CLARA DE OLIMAR | | |
|-----------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 9 | 33.33 |
| ESTOMAGO | 3 | 11.11 |
| COLO-RECTO | 3 | 11.11 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 11.11 |
| LARINGE | 2 | 7.41 |
| PULMON | 2 | 7.41 |
| OTROS | 5 | 18.52 |
| TOTAL | 27 | |

| VERGARA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PROSTATA | 8 | 20.51 |
| PULMON | 6 | 15.38 |
| PIEL NO MELANOMA | 4 | 10.26 |
| PRIMARIO DESC. | 3 | 7.69 |
| OTROS | 18 | 46.15 |
| TOTAL | 39 | |

| GRAL. ENRIQUE MARTINEZ | | |
|------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | |
| PANCREAS | 1 | |
| PULMON | 1 | |
| RIÑON | 1 | |
| VEJIGA | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |
| TOTAL | 6 | |

| CERRO CHATO | | |
|----------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| Datos agrupados en Durazno | | |

| VILLA SARA | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| RIÑON | 2 | 22.22 |
| CAVIDAD ORAL Y FARINGE | 1 | 11.11 |
| ESOFAGO | 1 | 11.11 |
| ESTOMAGO | 1 | 11.11 |
| PANCREAS | 1 | 11.11 |
| PULMON | 1 | 11.11 |
| SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | 11.11 |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | 11.11 |
| TOTAL | 9 | |

| ZONA RURAL | | |
|------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 2 | 20.00 |
| PULMON | 2 | 20.00 |
| OTROS | 6 | 60.00 |
| TOTAL | 10 | |

MUJERES

| CIUDAD DE TREINTA Y TRES | | |
|--------------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| MAMA | 81 | 21.72 |
| COLO-RECTO | 49 | 13.14 |
| PIEL NO MELANOMA | 44 | 11.80 |
| PULMON | 24 | 6.43 |
| PANCREAS | 15 | 4.02 |
| CUELLO DE UTERO | 15 | 4.02 |
| PRIMARIO DESC. | 15 | 4.02 |
| OTROS | 130 | 34.85 |
| TOTAL | 373 | |

| VILLA SARA | | |
|------------|-------|---|
| | Casos | % |
| VULVA | 1 | |

| VERGARA | | |
|------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| PULMON | 4 | 16.67 |
| MAMA | 4 | 16.67 |
| PANCREAS | 3 | 12.50 |
| PIEL NO MELANOMA | 3 | 12.50 |
| OTROS | 10 | 41.67 |
| TOTAL | 24 | |

| GRAL. ENRIQUE MARTINEZ | | |
|------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| COLO-RECTO | 2 | |
| PANCREAS | 1 | |
| MAMA | 1 | |
| PIEL NO MELANOMA | 1 | |

| SANTA CLARA DE OLIMAR | | |
|-----------------------|-------|-------|
| | Casos | % |
| ESOFAGO | 2 | 12.50 |
| ESTOMAGO | 2 | 12.50 |
| PANCREAS | 2 | 12.50 |
| LINFOMA NO HODGKIN | 2 | 12.50 |
| PIEL NO MELANOMA | 2 | 12.50 |
| OTROS | 6 | 37.50 |
| TOTAL | 16 | |

| CERRO CHATO | | |
|----------------------------|-------|---|
| | Casos | % |
| Datos agrupados en Durazno | | |