

Fecha publicación: Junio 2023
Se agrega al final cómo citar este documento.

CASOS Y TASAS

Periodo 2015-2019

	INCIDENCIA			MORTALIDAD		
	T. A.	Promedio anual de Casos	%	T. A.	Promedio anual de Casos	%
Hombres	37.05	937	12.88	18.64	520	11.68
Mujeres	25.17	875	12.56	11.50	490	13.12

T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

% sobre el total de cánceres (excluyendo piel no melanoma) para cada sexo.

El cáncer colo-rectal (CCR), para ambos sexos reunidos, es el segundo cáncer más frecuente en Uruguay luego del cáncer de mama, con unos 1800 casos nuevos cada año, y también la segunda causa de muerte por cáncer (luego del cáncer de pulmón) dando cuenta de más de 1000 muertes anuales.


Las tasas de CCR de Uruguay, tanto en incidencia como en mortalidad, se ubican internacionalmente en el quintil más alto (Globocan 2020). Aproximadamente un 4% de los uruguayos serán diagnosticados con CCR a lo largo de la vida. La sobrevida relativa (ambos sexos reunidos) a los 5 años es de un 55%.

Es de destacar que en este período, en las mujeres, la mortalidad por cáncer de pulmón superó a la mortalidad por cáncer de colon que en los análisis anteriores ocupaba el segundo lugar.

(*) se excluye en todas estas cifras el cáncer in situ.

TENDENCIAS DE LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD


TENDENCIAS RECIENTES DE LA INCIDENCIA EN URUGUAY CANCER DE COLO-RECTO 2002-2019



PCA (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (2002-2019).
(*) PCA con asterisco es estadísticamente significativo.

T.A. — Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE COLO-RECTO 1990-2020




PCA (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (1990-2020).
(*) PCA con asterisco es estadísticamente significativo.

T.A. — Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.


El CCR ha mantenido estable sus tasas de incidencia en el período 2002-2019 en hombres, en tanto que en mujeres se advierte un descenso a partir del 2013, un 2.26% anual. Igualmente, las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (período 1990-2020), se han mantenido estables en hombres, mientras que en mujeres se observa un descenso leve pero significativo de un 0.76% anual a lo largo del período. Es importante remarcar el aumento observado en la incidencia en adultos jóvenes de entre 40 y 49 años (con APCs de 3.1 y 2.1 en hombres y mujeres, respectivamente) entre 2002 y 2017. También se observó el ascenso de la incidencia en hombres mayores de 70 años en igual período. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Musetti C, Garau M, Alonso R, Piñeros M, Soerjomataram I, Barrios E. Colorectal Cancer in Young and Older Adults in Uruguay: Changes in Recent Incidence and Mortality Trends. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Aug 3;18(15):8232. doi: 10.3390/ijerph18158232. PMID: 34360522; PMCID: PMC8346091.

CÁNCER DE COLO-RECTO. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la Incidencia*
HOMBRES




CÁNCER DE COLO-RECTO. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la Incidencia*
MUJERES




*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

CÁNCER DE COLO-RECTO. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la Mortalidad*
HOMBRES



CÁNCER DE COLO-RECTO. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la Mortalidad*
MUJERES



*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

DISTRIBUCION POR EDADES

Periodo 2015-2019

INCIDENCIA

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

HOMBRES

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	TOTAL Período
C18-20	Colo-recto	0	1	3	5	8	14	31	57	97	161	224	374	552	651	733	733	595	445	2	937	4686
C18	Colon	0	1	3	5	7	7	19	32	56	109	129	233	355	425	504	492	411	337	2	625	3127
C19-20	Recto, recto sigmoides	0	0	0	0	1	7	12	25	41	52	95	141	197	226	229	241	184	108	0	312	1559

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C18-20	Colo-recto	0.00	0.18	0.47	0.74	1.35	2.62	5.20	9.70	20.52	32.82	44.46	82.06	150.14	207.80	320.03	381.61	424.48	485.70	59.03	37.05
C18	Colon	0.00	0.18	0.47	0.74	1.18	1.31	3.19	5.44	11.85	22.22	25.60	51.12	96.56	135.66	220.05	256.14	293.21	367.82	39.39	24.41
C19-20	Recto, recto sigmoides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.31	2.01	4.25	8.68	10.60	18.85	30.94	53.58	72.14	99.98	125.47	131.27	117.88	19.64	12.64

MORTALIDAD

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	TOTAL Período
C18-20	Colo-recto	0	0	0	1	0	4	12	16	30	42	85	147	225	319	403	444	429	438	3	520	2598
C18	Colon	0	0	0	1	0	2	8	10	15	26	45	85	151	196	255	278	292	318	3	337	1685
C19-20	Recto, recto sigmoides	0	0	0	0	0	2	4	6	15	16	40	62	74	123	148	166	137	120	0	183	913

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C18-20	Colo-recto	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.75	2.01	2.72	6.35	8.56	16.87	32.25	61.20	101.82	175.95	231.15	306.05	478.06	32.73	18.64
C18	Colon	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.37	1.34	1.70	3.17	5.30	8.93	18.65	41.07	62.56	111.34	144.73	208.31	347.09	21.23	11.90
C19-20	Recto, recto sigmoides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.67	1.02	3.17	3.26	7.94	13.60	20.13	39.26	64.62	86.42	97.74	130.98	11.50	6.74

*T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

INCIDENCIA

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

MUJERES

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	TOTAL Período
C18-20	Colo-recto	0	1	6	15	17	14	24	62	101	149	231	317	414	468	568	627	616	742	2	875	4374
C18	Colon	0	1	6	14	15	10	14	36	72	98	150	218	303	338	419	476	469	594	1	647	3234
C19-20	Recto, recto sigmoides	0	0	0	1	2	4	10	26	29	51	81	99	111	130	149	151	147	148	1	228	1140

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C18-20	Colo-recto	0.00	0.19	0.98	2.30	2.80	2.55	3.77	10.10	19.99	27.93	42.12	62.30	97.15	121.91	185.48	208.22	234.98	321.48	50.37	25.17
C18	Colon	0.00	0.19	0.98	2.15	2.47	1.82	2.20	5.87	14.25	18.37	27.35	42.84	71.10	88.04	136.82	158.08	178.91	257.35	37.24	18.15
C19-20	Recto, recto sigmoides	0.00	0.00	0.00	0.15	0.33	0.73	1.57	4.24	5.74	9.56	14.77	19.46	26.05	33.86	48.66	50.15	56.08	64.12	13.13	7.01

MORTALIDAD

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	TOTAL Período
C18-20	Colo-recto	0	0	0	1	0	2	6	18	24	58	73	112	175	220	288	355	413	705	2	490	2452
C18	Colon	0	0	0	1	0	2	2	15	21	39	43	72	124	151	212	265	315	556	1	364	1819
C19-20	Recto, recto sigmoides	0	0	0	0	0	0	4	3	3	19	30	40	52	69	76	90	98	149	1	127	634

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C18-20	Colo-recto	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.36	0.94	2.93	4.75	10.87	13.31	22.01	41.07	57.31	94.05	117.89	157.55	305.44	28.24	11.50
C18	Colon	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.36	0.31	2.44	4.16	7.31	7.84	14.15	29.10	39.33	69.23	88.00	120.16	240.89	20.95	8.27
C19-20	Recto, recto sigmoides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.49	0.59	3.56	5.47	7.86	12.20	17.97	24.82	29.89	37.38	64.55	7.30	3.24


*T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

DISTRIBUCION POR EDADES

Periodo 2015-2019


CANCER DE COLO-RECTO PERIODO 2015-2019

Distribución de las tasas específicas por edad
HOMBRES



CANCER DE COLO-RECTO PERIODO 2015-2019

Distribución de las tasas específicas por edad
MUJERES




PRINCIPALES SITIOS DEL CANCER

Periodo 2015-2019


CANCER EN URUGUAY 2015-2019

Principales sitios de Incidencia con su respectiva Mortalidad



CANCER EN URUGUAY 2015-2019


Principales sitios de Incidencia con su respectiva Mortalidad




* La categoría Colo-recto involucra los códigos C18-C20 de la CIE-O 3ª Ed. IARC-OMS (colon, unión recto sigmoidea y recto)

INCIDENCIA DEL CANCER DE **COLO-RECTO** - **HOMBRES**


Estimated age-standardized incidence rates (World) in 2020, Colorectum, males, all ages

INCIDENCIA DEL CANCER DE **COLO-RECTO** - **MUJERES**


Estimated age-standardized incidence rates (World) in 2020, Colorectum, females, all ages

MORTALIDAD POR CANCER DE **COLO-RECTO** - **HOMBRES**

Estimated age-standardized mortality rates (World) in 2020, Colorectum, males, all ages

MORTALIDAD POR CANCER DE **COLO-RECTO** - **MUJERES**

Estimated age-standardized mortality rates (World) in 2020, Colorectum, females, all ages



GLOBOCAN 2020. Graph production: IARC (<http://gco.iarc.fr/today>)
World Health Organization

T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

Es importante tener en cuenta las limitaciones expresadas por los propios autores en el siguiente link <https://gco.iarc.fr/today>
Secciones About y Data & Methods

Cómo citar:

CHLCC. Resumen Estadístico – COLO-RECTO. Incidencia y Mortalidad periodo 2015-2019. Tendencia de la Mortalidad hasta 2020. <https://www.comisioncancer.org.uy/Ocultas/RESUMENES-ESTADISTICOS-para-los-canceres-mas-frecuentes--uc264> [Fecha de consulta: xx/xx/xxxx]