

Fecha publicación: Junio 2023
Se agrega al final cómo citar este documento.

CASOS Y TASAS

Periodo 2015-2019

INCIDENCIA			MORTALIDAD		
T. A.	Promedio anual de Casos	%	T. A.	Promedio anual de Casos	%
14.35	313	4.50	5.27	134	3.57


T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

% sobre el total de cánceres (excluyendo piel no melanoma) para cada sexo.

En Uruguay el cáncer de cuello de útero (cervix) es el cuarto más frecuente en la mujer (cuando se ordenan según sus tasas de incidencia estandarizadas por edad), luego de los cánceres de mama, colo-recto y pulmón. Es de destacar que en los análisis de períodos anteriores el cáncer de cervix era el tercero más frecuente en mujeres, pero en este período ha sido superado por el cáncer de pulmón, de incidencia creciente. En el último quinquenio registrado (2015-2019) se diagnosticaron en promedio unos 313 casos nuevos anuales de cáncer de cervix invasor (excluyendo cáncer in situ) y unas 134 mujeres murieron cada año por esta causa en nuestro país. Las tasas de incidencia por cáncer de cervix de Uruguay, se ubican en el tercer quintil en el contexto internacional, mientras las de mortalidad se ubican en el segundo más bajo (Globocan 2020).

TENDENCIAS DE LA INCIDENCIA

TENDENCIAS RECIENTES DE LA INCIDENCIA EN URUGUAY CANCER DE CUELLO DE UTERO 2002-2019




PCAe (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (2002-2019).
(*) PCAe con asterisco es estadísticamente significativo.

T.A. – Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

Las tasas de incidencia (estandarizadas por edad) del cáncer de cervix cayeron sostenida y significativamente en el período 2002-2019 a razón de un 1.73% por año.

TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD

TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD EN URUGUAY CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO 1990-2020



PCAЕ (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (1990-2020).
(*) PCAЕ con asterisco es estadísticamente significativo.


T.A. – Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

Las tasas de mortalidad también cayeron significativamente a razón de un 1.15% anual en el período 1998-2020, acumulando un descenso en este último tramo superior al 28%. Los valores de estas tasas tienen importantes fluctuaciones en años recientes del período. El ascenso observado en el tramo 1990-1997 es muy probablemente “artefactual” y debido a un creciente registro de muertes por cáncer de cérvix (C53) a costa de un descenso en las muertes por cáncer de útero “sin especificar subsitio” (C55) como consecuencia del progreso en la calidad de registro de la causa de muerte.


INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO

Periodo 2015-2019

Distribución geográfica de la incidencia* del cáncer de CUELLO DE ÚTERO. Periodo 2015-2019



Distribución geográfica de la mortalidad* por cáncer de CUELLO DE ÚTERO. Periodo 2015-2019



*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

INCIDENCIA

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	TOTAL Periodo
C53 Cuello de útero	0	0	0	5	22	86	146	195	203	145	150	131	139	91	91	67	63	32	0	313	1566

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C53 Cuello de útero	0.00	0.00	0.00	0.77	3.63	15.64	22.91	31.78	40.18	27.18	27.35	25.74	32.62	23.70	29.72	22.25	24.03	13.86	18.03	14.35

MORTALIDAD

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	TOTAL Periodo
C53 Cuello de útero	0	0	0	0	3	9	35	48	57	54	55	64	82	56	68	60	38	39	0	134	668


TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C53 Cuello de útero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.64	5.49	7.82	11.28	10.12	10.03	12.58	19.24	14.59	22.21	19.93	14.50	16.90	7.69	5.27


*T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.

CANCER DE CUELLO DE UTERO
PERIODO 2015-2019

Distribución de las tasas específicas por edad





CANCER EN URUGUAY 2015-2019
Principales sitios de Incidencia con su respectiva Mortalidad



* La categoría Colo-recto involucra los códigos C18-C20 de la CIE-O 3ª Ed. IARC-OMS (colon, unión recto sigmoidea y recto)

INCIDENCIA DEL CANCER DE CUELLO DE ÚTERO

MORTALIDAD POR CANCER DE CUELLO DE ÚTERO



GLOBOCAN 2020. Graph production: IARC (<http://gco.iarc.fr/today>)
World Health Organization

T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

Es importante tener en cuenta las limitaciones expresadas por los propios autores en el siguiente link <https://gco.iarc.fr/today>
Secciones About y Data & Methods

Cómo citar:
CHLCC. Resumen Estadístico - CUELLO DE ÚTERO. Incidencia y Mortalidad periodo 2015-2019. Tendencia de la Mortalidad hasta 2020. <https://www.comisioncancer.org.uy/Ocultas/RESUMENES-ESTADISTICOS-para-los-canceres-mas-frecuentes--uc264> [Fecha de consulta: xx/xx/xxxx]